

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Дибазол-УБФ

Регистрационный номер

Торговое наименование: Дибазол-УБФ

Международное непатентованное наименование: Бендазол

Лекарственная форма: Таблетки

Состав

1 таблетка содержит:

Действующие вещества: бендазола гидрохлорид - 20 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 192 мг, крахмал
картофельный – 38 мг, кальция стеарат – 3 мг, повидон К17 –
5 мг, тальк – 2 мг

Описание

Таблетки белого или белого со слегка сероватым или желтоватым оттенком цвета, круглой плоскоцилиндрической формы с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа

Периферические вазодилататоры; другие периферические вазодилататоры.

Код АТХ: C04AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Спазмолитическое средство миотропного действия. Оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов, расширяет сосуды. Снижает артериальное давление за счет уменьшения сердечного выброса и расширения периферических сосудов. Антигипертензивное действие весьма умеренное, а эффект непродолжителен. Обладает умеренной иммуномодулирующей активностью.

Фармакокинетика Исследования не проводились.

Показания к применению

Дибазол-УБФ применяют в качестве вспомогательного средства в комплексном лечении

артериальной гипертензии у взрослых пациентов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к бендазолу и другим компонентам препарата.

Заболевания, протекающие с повышенным мышечным тонусом – судорожный синдром.

Детский возраст до 18 лет.

Беременность.

Период грудного вскармливания.

Редкая наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

С осторожностью

Пожилой возраст, нарушение функции почек.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний, перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Поскольку данные о безопасности препарата для плода отсутствуют, его нельзя применять в период беременности. В период грудного вскармливания, при необходимости применения препарата Дибазол-УБФ, следует прекратить кормление грудью на время лечения препаратом.

Способ применения и дозы

Взрослые - по 20-50 мг 2-3 раза в сутки в течение 3-4 недель или более короткими курсами. Применяют внутрь за 2 часа до еды или через 2 часа после еды.

Пожилой возраст. Безопасность и эффективность применения бендазола у пациентов пожилого возраста при длительном лечении артериальной гипертензии не установлены. Данные отсутствуют.

Пациенты с нарушением функции почек и (или) печени. Безопасность и эффективность применения бендазола у пациентов с нарушением функции почек и (или) печени не установлены. Данные отсутствуют.

Дети. Безопасность и эффективность применения бендазола у детей в возрасте до 18 лет не установлены. Данные отсутствуют.

Если после лечения улучшения не наступает или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые

указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Нарушения со стороны нервной системы: головокружение, легкая головная боль, ощущение жара.

Нарушения со стороны сосудов: снижение артериального давления.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота.

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: повышенное потоотделение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу

Передозировка

Необходимо немедленно обратиться к врачу при передозировке препарата.

Симптомы: сведения о случаях передозировки отсутствуют. Наиболее вероятным нежелательным явлением может быть выраженное снижение артериального давления.

Лечение: при выраженном снижении артериального давления придать пациенту положение «лежа» с приподнятыми нижними конечностями, проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Антигипертензивное действие бендазола усиливается при одновременном применении его с антигипертензивными препаратами других фармакотерапевтических групп и диуретическими средствами. Бендазол предупреждает обусловленное бета-адреноблокаторами увеличение общего периферического сосудистого сопротивления. Фентоламин усиливает антигипертензивное действие бендазола.

Особые указания

Не рекомендуется назначать для длительного лечения артериальной гипертензии, особенно пациентам пожилого возраста, так как гипотензивный эффект связан с уменьшением сердечного выброса и возможно ухудшение показателей электрокардиограммы.

Эффективность и безопасность приема бендазола внутрь для купирования гипертонического криза не изучены, в связи с чем не следует применять препарат Дибазол-УБФ как средство экстренной помощи при гипертоническом кризе.

Вспомогательные вещества. Препарат Дибазол-УБФ содержит лактозы моногидрат (сахар молочный). Пациентам с редко встречающимися наследственными заболеваниями, такими

как непереносимость галактозы, непереносимость лактозы вследствие дефицита лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции, не следует принимать данный лекарственный препарат.

Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

Следует обратиться к врачу в случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения не рекомендуется управление транспортными средствами, а также занятие другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной с термосвариваемым покрытием.

По 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 таблеток в банки полимерные из полиэтилена низкого давления с навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления. На банку наклеивают этикетку самоклеящуюся.

Каждую банку или 1, 2, 3, 4, 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Уралбиофарм», Россия,

620026, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, стр. 60

Тел. (343) 254-01-93

Электронная почта: ubf@ubf.ru

Производитель

АО «Уралбиофарм», Россия,

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60

тел. (343) 254-01-93

Электронная почта: ubf@ubf.ru

Организация, принимающая претензии от потребителей:

АО «Уралбиофарм», Россия,

620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, стр. 60

тел. (343) 254-02-45; (343) 254-01-93

Электронная почта: ubf@ubf.ru