

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Доритрицин

Регистрационное удостоверение:

Торговое название: Доритрицин

Международное непатентованное название или группировочное название:

бензалкония хлорид+бензокаин+тиротрицин&

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав:

1 таблетка содержит:

Активные вещества:

бензалкония хлорид 1,00 мг

бензокаин 1,50 мг

тиротрицин 0,50 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, тальк, повидон-25 тыс., кармеллоза натрия, сахарозы стеарат, мяты перечной листьев масло, натрия сахаринат

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, с маркировкой DORITHRICIN на одной стороне, белого цвета с мятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: комбинированное антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комплексный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Бензокаин является местным анестезирующим средством, уменьшающим боль при глотании, которая часто сопровождает инфекционно-воспалительные процессы полости рта и горла.

Бензалкония хлорид является четвертичным аммониевым соединением, относится к катионовым сурфактантам, взаимодействует с липопротеидами и нарушает проницаемость клеточных мембран. Обладает антисептическими свойствами, активен в отношении грамположительных бактерий, оказывает фунгицидное действие на *Candida albicans* и некоторые липофильные вирусы.

Тиротрицин – антибиотик местного действия, представляет собой смесь антимикробных линейных и циклических полипептидов, выделенных на стадии ферментации *Brevibacillus brevis* Dudos, состоящий преимущественно из грамицидина и тироцидина. Тиротрицин действует бактерицидно, вызывая разрыв процессов фосфорилирования в цепи клеточного дыхания и разрушая мембраны бактериальных клеток. В связи с особым механизмом действия тиротрицина, отсутствующего у антибиотиков системного действия, перекрестная устойчивость к препарату не возникает.

Фармакокинетика

Бензокаин малорастворим в воде, что обуславливает его медленную абсорбцию. Как и все эфирные производные пара-аминобензойной кислоты, расщепляется эстеразой в плазме крови и печени. В результате образуются пара-аминобензойная кислота и этиловый спирт, метаболизирующийся до ацетилкофермента А. Пара-аминобензойная кислота подвергается конъюгации с глицином или выводится почками в неизменном виде. Бензалкония хлорид практически не абсорбируется, не оказывает резорбтивного действия и выводится почками. Не обнаружено накопление вещества в тканях организма. Тиротрицин – в связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике отсутствуют. Не влияет на кишечную микрофлору.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, сопровождающиеся болевым синдромом:

- фарингит, ларингит, начальная стадия ангины
- воспаление десен и слизистой оболочки полости рта (гингивит, стоматит).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к любому из компонентов препарата; наследственная непереносимость фруктозы и синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы или дефицит сахаразы/изомальтазы; детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата Доритрицин в период беременности и лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 6 лет, медленно рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждые 3 часа. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости – по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, редко - желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В рекомендованных дозах случаев передозировки не описано. Случайный прием больших доз Доритрицина может вызвать нарушения со стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея). В таком случае необходимо промыть желудок, принять активированный уголь и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано случаев клинически значимого взаимодействия препарата Доритрицин с другими лекарственными средствами.

Особые указания

Информация для больных сахарным диабетом: в 1 таблетке препарата содержание

углеводов составляет $\approx 0,07$ хлебных единиц (ХЕ).

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами»

Не влияет.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания:

По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения

При комнатной температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Название фирмы и адрес производителя

Медице Фарма ГмбХ & Ко. КГ, Куловиг 37, 58638 Изерлон, Германия (владелец
регистрационного удостоверения);

Римзер Спешиалти Продакшн ГмбХ, Миттельштрассе 18, 88471 Лаупхайм, Германия
(производитель)

Адрес представительства/организация, принимающая претензии в Москве

ООО «Феу-Дагаз Компани», 105094, Москва, Семеновская наб., д.3/1, стр.11. тел/факс:
(499) 137-15-52

Генеральный директор
ООО «Феу-Дагаз Компани»



Сырямин Д.В.

