

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**Доритрицин®**

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки для рассасывания

(лекарственная форма, дозировка)

Медице Арцнаймиттель Пюттер ГмбХ & Ко. КГ, Германия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 10

Срок введения изменений с " ____ " _____ г.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
СОСТАВ	СОСТАВ
Состав:	Состав:
1 таблетка содержит:	1 таблетка содержит:
<i>Активные вещества:</i>	<i>Действующие вещества:</i>
Бензокаин 1,50 мг	Бензокаин 1,50 мг
бензалкония хлорид 1,00 мг	бензалкония хлорид 1,00 мг
тиротрицин 0,50 мг	тиротрицин 0,50 мг
<i>Вспомогательные вещества:</i> сорбитол 871,00 мг, тальк 80,00 мг, повидон-25 тыс. 10,00 мг, кармеллоза натрия 10,00 мг, сахарозы стеарат 20,00 мг, мяты перечной листьев масло 5,00 мг, натрия сахаринат 1,00 мг	<i>Вспомогательные вещества:</i> сорбитол 871,00 мг, тальк 80,00 мг, повидон-25 тыс. 10,00 мг, кармеллоза натрия 10,00 мг, сахарозы стеарат 20,00 мг, мяты перечной листьев масло 5,00 мг, натрия сахаринат 1,00 мг.

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Внутрь. Взрослым и детям старше 6 лет, медленно рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждые 3 часа. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости – по рекомендации врача. Не рекомендуется прием пищи и жевание жевательной резинки в течение 1 часа после применения препарата или до тех пор, пока ощущается онемение во рту и горле, так как есть риск аспирации, и повреждения слизистой оболочки ротовой полости. Если состояние пациента не улучшается через 2-3 дня применения препарата, необходимо обратиться к врачу.	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ Внутрь. Взрослым и детям старше 6 лет, медленно рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждые 3 часа. Максимальная суточная доза составляет 6 таблеток. Курс лечения 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости – по рекомендации врача. Не рекомендуется прием пищи и жевание жевательной резинки в течение 1 часа после применения препарата или до тех пор, пока ощущается онемение во рту и горле, так как есть риск аспирации, и повреждения слизистой оболочки ротовой полости. Если состояние пациента не улучшается через 2-3 дня применения препарата, необходимо обратиться к врачу.

Генеральный директор
ООО «фармрег.ру»



О. А. Ким