ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

ЛАКРИСИФИ

Регистрационный номер:

Торговое название: Лакрисифи.

Лекарственная форма: капли глазные

Международное непатентованное или группировочное название: бензалкония хлорид+гипромеллоза

Состав на 100 мл:

Активные вещества: гипромеллоза 0,500 г, бензалкония хлорид 0,010 г.

Вспомогательные вещества: натрия гидрофосфата додекагидрат, натрия дигидрофосфата моногидрат, натрия хлорид, динатрия эдетат, вода очищенная.

Описание:

Прозрачный бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор.

Фармакотерапевтическая группа: Кератопротекторное средство.

Код АТХ: S01XA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гипромеллоза является протектором эпителия роговицы, обладая высокой вязкостью, увеличивает продолжительность контакта раствора с роговицей. Показатель преломления раствора аналогичен естественным слезам.

Восстанавливает, стабилизирует и воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Удлиняет действие других глазных капель и защищает роговицу от их раздражающего действия.

Бензалкония хлорид – обладает дезинфекционным действием и некоторыми свойствами катионных детергентов. Оказывает бактерицидное действие в отношении грамположительных микроорганизмов, некоторых дрожжевых грибов. Менее активен в отношении P.aerugenosa, M.tuberculosis, Clostridia spp., спорогенных микроорганизмов и вирусов.

Фармакокинетика

Абсорбция бензалкония хлорида является ограниченной.

Показания к применению

Недостаточное слезоотделение, лагофтальм, деформация век, эктропион, состояние после пластических операций на веках, эрозия и трофические язвы роговицы, состояние после хирургических и термических ожогов роговицы и конъюнктивы, буллезные дистрофические изменения роговицы, кератопатия, микродефекты роговичного эпителия, состояние после кератопластики, кератоэктомии.

Необходимость в пролонгации эффекта или снижении раздражающего действия других глазных капель. Комбинированное лечение синдрома «сухого глаза»: синдром Шегрена, ксероз, кератоз (часто в сочетании с терапевтическими контактными линзами).

Раздражение глаз, вызванное дымом, пылью, холодом, ветром, солнцем, соленой водой, при аллергии.

Проведение диагностических процедур: гониоскопия, электроретинография, электроокулография, УЗИ.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные и инфекционные заболевания переднего отдела глаза.

Беременность, период кормления грудью, детский возраст.

С осторожностью

В острой фазе химического ожога роговицы и конъюнктивы (до полного удаления токсичных веществ и некротизированных тканей).

Способ применения и дозы

Закапывать по 1-2 капли 4-8 раз в день в конъюнктивальный мешок. Не следует превышать рекомендованную дозу.

При назначении препарата для лечения синдрома «сухого глаза» длительность лечения определяется врачом.

При назначении препарата с противомикробной целью период применения составляет 5-7 дней.

Побочные эффекты

Аллергические реакции, чувство склеивания век (из-за большой вязкости раствора), чувство жжения или раздражения.

Развитие аллергических реакций возможно при длительном применении препарата. В этом случае показано прекращение лечения и назначение соответствующей терапии.

При длительном применении возможно развитие дистрофических изменений эпителия роговицы.

Передозировка

Сведения о передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат несовместим с глазными каплями, содержащими соли металлов.

Особые указания

Препарат не рекомендуется использовать при ношении контактных линз. Перед применением препарата следует снять контактные линзы и снова одеть их не ранее, чем через 20-30 минут.

Ввиду возможного слезотечения после закапывания препарата не рекомендуется применять его непосредственно перед управлением транспортными средствами или обслуживанием механического оборудования.

Форма выпуска

Капли глазные.

По 10 мл раствора во флаконы-капельницы из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) с крышками из белого полистирола. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ^{0}C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

После вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 28 дней.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Предприятие-производитель

С.И.Ф.И. С.п.А.

Виа Эрколе Патти, 36, 95020 - Аци С. Антонио, Катания, Италия.

Адрес для направления претензий:

Представительство АО «Замбон С.П.А.» (Италия):

Россия, 121002 Москва, Глазовский пер., д. 7, офис 17.

Тел.: (495) 933-38-30/32

Факс: (495) 933-38-31

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев

Представитель компании

S.I.F.I. S.p.A. Italy
36, Via Ercole Patti
95020 Lavinaio - Aci S. Antonio (CT)
V.A.T.: IT 00122890874
Tel. +39 095.7922111
Fax +39 095.7893435

Н.В. Алеутдинова