ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Регистрационный номер:

Торговое название: БЕНЗИЛБЕНЗОАТ

Международное непатентованное название (МНН) или группировочное название: бензилбензоат&

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав
Действующее вещество: бензилбензоат - 200 мг.
Вспомогательные вещества: полисорбат 80, карбомер, натрия гидроксид, метил парагидроксибензоат, бронопол, пропил парагидроксибензоат, вода очищенная до 1 г.

Описание
Мазь белого или почти белого цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: противочесоточное средство

Код АТХ: P03AX01

Фармакологические свойства
Противочесоточный препарат для наружного применения. Оказывает токсическое действие в отношении чесоточного клеща. Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей.

Фармакокинетика
Проникает в верхние слои эпидермиса, не всасывается в системный кровоток.

Показания к применению
Мазь применяется для лечения чесотки.

Противопоказания
Не рекомендуется использование детям до 3-х лет, беременным, в период кормления грудью.

Способ применения и дозы
Курс лечения продолжается 4 дня.
В первый день обработку проводят вечером перед сном после тщательного мытья

под душем теплой водой с мылом. Мазь втирают в кожу рук, затем туловища и ног, включая подошвы и пальцы. После обработки кожи следует использовать только чистое белье и одежду. На 2-ой и 3-ий дни делают перерыв в лечении, при этом остатки мази не смывают с кожи. На 4 -й день вечером больной моется с мылом и проводит втирание мази, как в первый день, используя оставшуюся мазь и еще раз меняет все белье. Руки после обработки не следует мыть в течение 3 часов; в последующем руки обрабатывают мазью после каждого мытья. В случае смывания мази с других участков кожи их нужно также повторно обработать. Мазь полностью смывают с кожи на пятый день лечения.

Побочное действие

Местные реакции: возможно (особенно у детей) ощущение жжения, раздражения кожи, аллергические реакции.

Особые указания

Лечение больных, выявленных в одном очаге, а также контактных лиц, должно проводиться одновременно во избежание повторного заражения.

Сохранение зуда после лечения не является показанием для назначения дополнительного курса специфической терапии. Зуд является реакцией организма на убитого клеща и продукты его жизнедеятельности и исчезает при назначении антигистаминных препаратов и мазей с глюкокортикостероидами. После лечения необходим врачебный контроль в течение 2 недель, а при наличии осложнений и более длительное время.

Все предметы, что соприкасались с зараженной кожей, должны быть подвергнуты тщательной обработке. Постельные принадлежности и белье, полотенца кипятят в растворе стирального порошка в течение 5-10 минут. Верхнюю одежду проглаживают с обеих сторон горячим утюгом. Вещи, не подлежащие термической обработке, вывешиваются на открытый воздух на 3 дня. Обувь, игрушки и прочие предметы исключают из пользования на 5 дней и помещают в целлофановый пакет. Матрацы, подушки, одеяла также исключаются из использования на 5 дней или подвергаются камерной дезинфекции. Мягкую мебель можно обработать препаратами для дезинсекции. В квартире необходимо провести уборку, мытье полов с моющими средствами или добавлением дезинфицирующих средств.

Необходимо избегать попадания препарата в глаза, нос, рот.

При попадании препарата:

- в рот: рот прополоскать обильно водой или 2% теплым раствором гидрокарбоната натрия (питьевой соды);
- в желудок: желудок промывают 1%-2% раствором гидрокарбоната натрия (питьевой соды), водной смесью жженой магнезии и активированного угля;
- в глаза: тщательно промыть водой или 1%-2% раствором гидрокарбоната натрия (питьевой соды).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 20%, по 30 г в тубе алюминиевой с внутренней поверхностью, покрытой лаком, с защитной алюминиевой мембраной на горловине и конусообразным приспособлением для прокола мембраны в навинчивающемся бушоне из полиэтилена или полипропилена. Тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного.

Условия хранения
При комнатной температуре (от 15°С до 25°С).
В недоступном для детей месте.

Срок годности
2,5 года
Не использовать по истечении указанного срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
АО Таллиннский фармацевтический завод,
Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстонская Республика.

Претензии потребителей направлять в адрес представительства в Москве.

Представительство в Москве
123242, Москва, ул. Б.Грузинская, д.14, комната правления 2,
тел. в Москве 771 65 05

Медицинский директор А.И.Зебрев

И.о.директора ИДКЭЛС А.Н.Васильев