ЛП-№(014053)-(РГ-RU) от 23.03.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5668
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БЕНЗОСТЕЗОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: БЕНЗОСТЕЗОЛ

Международное непатентованное или группировочное наименование: Бензокаин + Висмута субгаллат + Цинка оксид + [Левоментол]

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав

1 суппозиторий содержит:

Действующие вещества

Бензокаин	100,0 мг
Висмута субгаллат	40,0 мг
Левоментол	4,0 мг
Цинка оксид	20,0 мг

Вспомогательные вещества

Макрогол 1500	2314,2 мг
Макрогол 400	121,8 мг

Описание: суппозитории торпедообразной формы желтого или зеленовато-желтого цвета. Допускается наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для наружного применения при мышечных и суставных болях; нестероидные противовоспалительные препараты для наружного применения.

Код АТХ: M02AA13

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, оказывает местноанестезирующее, антисептическое, вяжущее и подсушивающее действие.

Показания к применению

Лекарственный препарат показан к применению у взрослых и детей с 12 лет при геморрое, трещинах заднего прохода.

Противопоказания

Гиперчувствительность к бензокаину, висмута субгаллату, цинка оксиду, левоментолу или к любому из вспомогательных веществ.

Детский возраст до 12 лет.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5668
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение препарата БЕНЗОСТЕЗОЛ при беременности возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для ребенка и плода.

Грудное вскармливание

Применение препарата БЕНЗОСТЕЗОЛ в период грудного вскармливания возможно, если потенциальная польза для матери превышает риск для ребенка и плода.

В случае необходимости применения препарата в период беременности или в период грудного вскармливания необходимо дополнительно проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально.

Взрослые и дети старше 12 лет.

По 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки, с интервалом между использованием не менее 6 часов. Предварительно освободив суппозиторий от контурной ячейковой упаковки, вводят в задний проход (после очистительной клизмы или самопроизвольного опорожнения кишечника). Курс лечения зависит от тяжести и характера заболевания, как правило, составляет 7-10 дней. При необходимости, по рекомендации врача, курс лечения может быть продлен до 2 недель. Повторные курсы терапии возможны после консультации врача.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат согласно тем показаниям, тем способам применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Жжение в заднем проходе, слабительный эффект.

Нарушения со стороны иммунной системы

Аллергические реакции.

Нарушения со стороны крови и лимфатической системы

Имеются отдельные сообщения о случаях развития метгемоглобинемии при применении препаратов, содержащих бензокаин.

Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5668
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Симптомы

Симптомы передозировки могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Системная абсорбция бензокаина при передозировке может проявляться сонливостью, беспокойством, возбуждением, в тяжелых случаях – судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию, которая проявляется цианозом, дыхательными расстройствами, головокружением, слабостью, тахикардией.

Лечение

Симптоматическое. При метгемоглобинемии показано применение аскорбиновой кислоты – 1 г внутрь или в форме натриевой соли внутривенно – 0,1-0,15 мл/кг 1 % раствора до 50 мл.

При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Лекарственное взаимодействие препарата БЕНЗОСТЕЗОЛ не описано.

Особые указания

При применении препарата необходимо следить за гигиеной анальной области, избегать чрезмерного напряжения, принимать меры для поддержания мягкой консистенции стула.

Имеются отдельные сообщения о случаях развития метгемоглобинемии при применении препаратов, содержащих бензокаин.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Не превышайте максимальные сроки лечения и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной.

На контурную ячейковую упаковку допускается наклеивать этикетку из бумаги писчей или этикеточной, или самоклеящуюся.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 суппозиториев вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 19.03.2026 № 5668
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Условия хранения

При температуре не выше 20 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.