ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МЕНОВАЗИН

Регистрационный номер:

Торговое название: Меновазин

Международное непатентованное или группировочное название:
бензокаин+прокаин+левоментол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав на 100 мл:
активные вещества: левоментол - 2,5 г; прокаина гидрохлорид (новокаина гидрохлорид) - 1,0 г; бензокаин (анестезин) - 1,0 г;
вспомогательные вещества: этанол (этиловый спирт) 70 % до 100 мл

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа: местноанестезирующее средство.
Код АТХ: [D04AB]

Фармакологическое действие
Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местноанестезирующее действие.
Левоментол при нанесении на кожу вызывает раздражение нервных окончаний, расширяет поверхностные сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, сопровождающееся анальгезирующим эффектом и облегчением зуда. Усиливает анестезирующее действие прокаина и бензокаина.
Прокаин - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам.
Бензокаин - местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным волокнам.

Показания к применению
В качестве местноанестезирующего средства при невралгиях, миалгиях, артралгиях и зудящих дерматозах.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема). Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных).

Способ применения и дозы
Наружно, наносят на кожу над пораженной областью и растирают или наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжается в зависимости от лечебного эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочные действия
Аллергические реакции, контактный дерматит. При продолжительном применении возможно головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. В этих случаях прекращают применение препарата.

Форма выпуска
Раствор для наружного применения спиртовой.
По 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 мл во флаконы из оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или колпачками алюминиевыми с прокладками.
По 50, 100 мл в банки или бутылки из оранжевого стекла, укупоренные пробками и навинчиваемыми крышками.
Каждый флакон, банку, бутылку с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Допускается укладка флаконов в групповую упаковку с равным количеством инструкций по применению.


Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.


Срок годности
2 года.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель/Организация, принимающая претензии:
ОАО «Самарамедпром», Россия
446100 Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99 б.
Тел./факс (846)373-81-07

Генеральный директор
ОАО «САМАРАМЕДПРОМ» Н.Л. Стышнева





57993