ЛП-№(013052)-(РГ-RU) от 30.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32287
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МЕНОВАЗИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Меновазин

Международное непатентованное или группировочное наименование: бензокаин + прокаин + левоментол

Лекарственная форма: раствор для наружного применения спиртовой

Состав:

100 мл содержат:

Действующие вещества: левоментол - 2,5 г, прокаина гидрохлорид (новокаина гидрохлорид) - 1,0 г, бензокаин (анестезин) - 1,0 г.

Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 70 % - до 100 мл.

Описание: бесцветная прозрачная жидкость с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: анестетики; местные анестетики; эфиры аминобензойной кислоты.

Код АТХ: N01BA52

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает местноанестезирующее действие.

Левоментол при нанесении на кожу вызывает раздражение нервных окончаний, расширяет поверхностные сосуды кожи, вызывая ощущение прохлады, сопровождающееся анальгезирующим эффектом и облегчением зуда. Усиливает анестезирующее действие прокаина и бензокаина.

Прокаин - местноанестезирующее средство с умеренной анестезирующей активностью. Блокирует натриевые каналы, препятствует генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению импульсов по нервным волокнам.

Бензокаин - местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов и их проведению по нервным волокнам.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32287
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению

В качестве местноанестезирующего средства при невралгиях, миалгиях, артралгиях и зудящих дерматозах.

Противопоказания

- гиперчувствительность к бензокаину, прокаину, левоментолу или другим компонентам препарата;
- нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема);
- беременность;
- период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят на кожу над пораженной областью и растирают или наносят на пораженные участки кожи (зудящие дерматозы) 2-3 раза в сутки. Курс лечения продолжается в зависимости от терапевтического эффекта, но не более 3-4 недель. При необходимости курс лечения повторяют.

Побочное действие

При применении препарата возможны аллергические реакции, контактный дерматит. При продолжительном применении возможно головокружение, общая слабость, снижение артериального давления. В этих случаях прекращают применение препарата.

Если при применении препарата появляются любые из указанных в инструкции побочных эффектов, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы

При чрезмерном нанесении или длительном его применении возможно усиление нежелательных реакций.

Лечение

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32287
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

Не наносить препарат на воспаленную кожу или при нарушении целостности кожных покровов. Не наносить препарат на слизистые оболочки. Избегать попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза, следует обильно промыть их водой. После использования препарата рекомендуется вымыть руки.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит этанол (этиловый спирт). Содержание абсолютного этилового спирта в 100 мл препарата составляет 84,7 г (847 мг в 1 мл).

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат Меновазин не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения спиртовой.

По 40, 50 мл препарата во флаконы оранжевого стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками, с пластмассовыми крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, также допускается использование крышек без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение в каждую пачку отдельно лежащей насадки-распылителя из полиэтилена или полипропилена с защитным колпачком или без колпачка, в пакете полиэтиленовом или без пакета.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 40, 50 мл с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 25.12.2025 № 32287
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Производитель

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Организация, принимающая претензии потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Россия, 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел. (8332) 22-01-26

E-mail: kachestvo-s@k-ff.ru