

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)

Регистрационный номер:

Торговое наименование

ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому)

Международное непатентованное или группировочное наименование

Березы коры деготь + Висмута оксида и Висмута трибромфенолята комплекс

Лекарственная форма

Линимент для наружного применения

Состав

100 г содержат:

Действующие вещества:

Березы коры деготь	– 3 г
Ксероформ (трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс)	– 3 г

Вспомогательные вещества:

Аэросил (кремния диоксид коллоидный)	– 5 г
Касторовое масло (клещевины обыкновенной семян масло)	– 89 г

Описание

Линимент от светло-желтого до коричневого с зеленоватым оттенком цвета со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей. Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Лекарственный препарат ЛИНИМЕНТ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ (по Вишневскому) показан у взрослых и детей от 0 до 18 лет для лечения неинфицированных, длительно незаживающих послеоперационных, посттравматических ран кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к дегтю березовому, трибромфеноляту висмута и висмута оксида комплексу (ксероформу) или к любому из вспомогательных веществ, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (в т.ч. абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают повязку в 5-6 слоев марли с линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только

согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Аллергические реакции; при длительном применении возможно раздражение кожи.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадания линимента на слизистые оболочки и в глаза. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки для предотвращения попадания линимента в глаза, рот, нос.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения.

По 25, 30, 40, 50 г в банки оранжевого стекла с винтовой горловиной или в банки янтарного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками навинчиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления.

По 25, 30, 40, 50 г в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренные крышками натягиваемыми из полиэтилена высокого или низкого давления с уплотнительным элементом.

По 25, 30, 40, 50 г в банки из полиэтилена в комплекте с крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена с/без контроля первого вскрытия, или в банки из

полиэтилентерефталата в комплекте с крышками из полиэтилена высокого или низкого давления или полипропилена с/без контроля первого вскрытия.

По 25, 30, 40, 50 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком БФ-2, в комплекте с колпачками из полиэтилена высокого или низкого давления или в тубы из комбинированного материала с бушонами.

Каждую банку или тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка банок или туб без пачки от 9 до 300 штук вместе с равным количеством инструкций по применению в коробку картонную (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителя:

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72, ivff37.ru