

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Линимент бальзамический (по Вишневскому)**Регистрационный номер:****Торговое наименование препарата:** Линимент бальзамический (по Вишневскому)**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Берёзы коры дёготь + Висмута оксида и трибромфенолята висмута комплекс

Лекарственная форма: линимент для наружного применения**Состав:**

100 г препарата содержат:

Действующие вещества

Берёзы коры дёготь 3,0 г

Висмута оксида и трибромфенолята висмута комплекс 3,0 г

Вспомогательные вещества

Кремния диоксид коллоидный 5,0 г

Клецевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) 89,0 г

Описание:

Линимент от светло-желтого до зелено-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.**Код АТХ:** D08AX**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к дегтю березовому, трибромфеноляту висмута и Висмута оксида комплексу (ксероформу) или любым вспомогательным веществам препарата; острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступают или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении возможно раздражение кожи.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Вспомогательные вещества

Препарат содержит клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло), которое может вызывать кожные реакции.

Не допускать попадание линимента на слизистые оболочки и в глаза. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки для предотвращения попадания линимента в глаза, рот, нос.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Линимент бальзамический (по Вишневскому) не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения

По 15 г, 20 г, 25 г или 30 г в банки темного стекла типа БТС, укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 25 и 30 г в тубы алюминиевые, укупоренные бушоном. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Пачки помещают в групповую упаковку.

Допускается упаковка банок или туб без пачки по 50, 100, 150, 200, 250, 300 штук с равным количеством инструкций по медицинскому применению в коробку картонную (Для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолъе-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул. Индустриальная, зд. 62.

Тел.: +7 (395) 435-89-08.

Электронная почта: usolpharm@usolpharm.ru

Производитель

Российская Федерация.

Акционерное общество «Усолъе-Сибирский химико-фармацевтический завод» (АО «Усолъе-Сибирский химфармзавод»).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.06.2025 № 15436
(ПОСРЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 004)

665452, Иркутская обл., г.о. город Усолье-Сибирское, тер. Промышленный массив, ул.
Индустриальная, зд. 62.