

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Номер регистрационного удостоверения:

Торговое наименование:

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Березы коры деготь + Висмута трибромфенолята и Висмута оксида комплекс

Лекарственная форма: линимент для наружного применения

Состав:

100 г линимента содержат:

Действующие вещества:

березы коры деготь – 3,0 г, трибромфенолята висмута и висмута оксида комплекс (ксероформ) – 3,0 г.

Вспомогательные вещества:

аэросил (кремния диоксид коллоидный) – 5,0 г, клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) – 89,0 г.

Описание

Линимент от светло-желтого до коричневого с зеленоватым оттенком цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дегтю березовому, трибромфеноляту висмута и висмута оксида комплексу (ксероформу) или к другим компонентам препарата, острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочные действия

Аллергические реакции.

При длительном применении возможно раздражение кожи.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания линимента на слизистые оболочки и в глаза.

После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки для предотвращения попадания линимента в глаза, нос, рот.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения.

По 30 г в тубы алюминиевые с внутренним покрытием защитным лаком с бушонами из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) или полипропилена или в тубы из комбинированного материала, представляющего собой многослойный ламинат: полиэтилен высокого давления (низкой плотности) (наружный слой корпуса) – полиэтилен низкого давления (высокой плотности) (внутренний слой корпуса) с бушонами из полипропилена.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку картонную.

По 0,1 кг или 1 кг в банки из полипропилена или полиэтилена высокой плотности в комплекте с крышками, которые помещают в ящики из гофрированного картона (для стационаров).

На банку из полипропилена или полиэтилена высокой плотности наклеивают самоклеящуюся этикетку с маркировкой и инструкцией по медицинскому применению из бумаги этикеточной или писчей.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия

141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151,

Телефон: +7(495)993-99-95.

Адрес электронной почты: info@mazi.ru