

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭХИНОКОР

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ЭХИНОКОР

Международное непатентованное или группировочное наименование:
Березы листья + Солодки корни + Шиповника коричневого плоды + Эхинацеи
пурпурной трава

Лекарственная форма: Эликсир для приема внутрь

Состав

Для приготовления 1000 мл препарата используют:

Эхинацеи пурпурной трава	23,2 г
Березы листья	6,6 г
Солодки корни	5,8 г
Шиповника коричневого плоды	11,2 г

Вспомогательные вещества: сахароза 50,0 г, кислота лимонная 0,38 г, колер
эликсирный 7,5 г, спирт этиловый 95 % (этанол) 380,0 мл, вода очищенная до
1000 мл.

Описание

Прозрачная или опалесцирующая жидкость коричневого цвета, с ароматным
запахом. Допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы

Код АТХ: L03AX

Фармакологическое действие

Оказывает иммуностимулирующее действие, связанное с усилением
функциональной активности В-клеточного звена иммунитета, а именно
антителообразования; увеличивает пролиферативную активность

лимфоцитов селезенки и продукцию интерлейкина-2; стимулирует клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности организма; обладает противовоспалительной, а также антигипоксической и антиоксидантной активностью; способствует повышению устойчивости организма к физической нагрузке.

Показания к применению

Лекарственный препарат Эхинокор показан к применению у взрослых пациентов в составе комплексной терапии больных с часто рецидивирующими бактериальными и грибковыми инфекциями – хронический бронхит, хронический фурункулез, ротоглоточный кандидоз.

Противопоказания

Гиперчувствительность к березе листьям, солодки корням, шиповника коричного плодам, эхинацеи пурпурном траве и растениям семейства сложноцветных или к любому из вспомогательных веществ, возраст до 18 лет, прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз), СПИД и ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Назначается внутрь взрослым по 2 чайные ложки, разведенные в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды. Длительность лечения 10 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы

заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Особые указания

Не следует принимать препараты, содержащие эхинацею, более 8 недель.

Препарат Эхинокор содержит сахарозу и этиловый спирт.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: разовая доза содержит 0,5 г сахара, суточная – 1,5 г.

Пациенты с сахарным диабетом при применении препарата должны учитывать, что 1 чайная ложка (5 мл) содержит 0,25 г сахара, что соответствует 0,03 хлебных единиц (ХЕ), 1 капля препарата содержит 0,0015 г сахара, что соответствует 0,0002 хлебных единиц (ХЕ).

Пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует принимать этот препарат.

В составе препарата содержится 35-38 % спирта этилового (этанола).

Максимальная разовая доза препарата содержит 2,9 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата содержит 8,8 г абсолютного этилового спирта.

Лекарственный препарат содержит 35-38 % этанола (алкоголя), то есть до 2900 мг на дозу, что равно 55,7 мл пива, 22,1 мл вина на дозу.

Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени и эпилепсией.

Форма выпуска

Эликсир для приема внутрь.

По 100, 200 или 250 мл в бутылки стеклянные для пищевых жидкостей с винтовой горловиной. Бутылки укупоривают герметично металлическими закатываемыми колпачками с прокладками или пластмассовыми навинчивающимися крышками. На бутылки наклеивают этикетки с липкой основой.

Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре от +15 до +25°C в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии (Держатель регистрационного удостоверения):

Российская Федерация

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген»

Юридический адрес/адрес для направления претензий от потребителей:

188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 53-а,

тел/факс: +7(812) 336-16-82

Адрес производства: 188676, Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Щеглово, д. б/н.