

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФЛАМИН**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Фламин**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Бессмертника
песчаного цветков сумма флавоноидов**Лекарственная форма:** таблетки**Состав на одну таблетку***Активный компонент*

Фламин (Бессмертника песчаного цветков сумма флавоноидов) с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид и сухое вещество 60,0 %	— 0,05 г
---	----------

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат)	— 0,0576 г
Крахмал кукурузный	— 0,0533 г
Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат)	— 0,0173 г
Кальция стеарат	— 0,0018 г

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, желтого или желтого с сероватым или коричневатым оттенком цвета с более темными и более светлыми вкраплениями, с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей; средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей; другие средства для лечения желчевыводящих путей.

Код АТХ: A05AX**Фармакологические свойства**

Оказывает желчегонное, холекинетическое, холеретическое, противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое и ранозаживляющее действие. Усиливает секрецию желчи и увеличивает содержание в ней билирубина, повышает тонус желчного пузыря

и способствует оттоку желчи. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру сфинктеров желчного пузыря и желчевыводящих путей, изменяет вязкость и химический состав желчи.

Стимулируя выделение желудочного сока и замедляя эвакуаторную функцию желудка и кишечника, способствует более качественному перевариванию пищи. Активирует внешнесекреторную деятельность поджелудочной железы; расширяет кровеносные сосуды кишечника.

Способствуя выделению холестерина с желчью, оказывает гипохолестеринемическое действие; обладает антибактериальной активностью в отношении грамположительных бактерий.

Показания к применению

Хронический гепатохолецистит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, холелитиаз, обтурационная желтуха, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения, возраст до 12 лет, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Артериальная гипертензия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды (с небольшим количеством теплой воды). При необходимости – по 2 таблетки 2-3 раза в день. Курс лечения 10-40 дней. Повторные курсы лечения возможны по согласованию с врачом.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции; повышение артериального давления (у пациентов с артериальной гипертензией).

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: при передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Повышает активность метронидазола и аминохинола при лечении лямблиоза.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки, 50 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2 или 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.