# ИНСТРУКЦИЯ
## по медицинскому применению препарата
## ВАЗОСЕРК

**Регистрационный номер:**
**Торговое название:** ВАЗОСЕРК
**Международное непатентованное название:** бетагистин
**Лекарственная форма:** таблетки
**Состав**
активное вещество: бетагистина дигидрохлорид
вспомогательные вещества: маннитол, целлюлоза микрокристаллическая, тальк, кремния диоксид коллоидный.
**Описание**
*Таблетки 8 мг*
Круглые белого цвета таблетки с надпечаткой «AI» на одной стороне и «VASOSERC» на другой стороне.
*Таблетки 16 мг*
Круглые белого цвета таблетки с риской на одной стороне.
*Таблетки 24 мг*
Круглые белого цвета таблетки с риской на одной стороне.
**Фармакотерапевтическая группа:** препарат гистамина.
**Код АТХ** [N07CA01].

**Фармакодинамика**
Бетагистин действует главным образом на гистаминовые $H_1$- и $H_3$-рецепторы внутреннего уха и вестибулярных ядер ЦНС. Путём прямого агонистического воздействия на $H_1$-рецепторы сосудов внутреннего уха, а также опосредованно через воздействие на $H_3$-рецепторы улучшает микроциркуляцию и проницаемость капилляров, нормализует давление эндолимфы в лабиринте и улитке. Вместе с тем бетагистин увеличивает кровоток в базиллярной артерии.
Обладает выраженным центральным эффектом, являясь ингибитором $H_3$-рецепторов ядер вестибулярного нерва. Улучшает проводимость в нейронах вестибулярных ядер на уровне ствола головного мозга.
Клиническим проявлением указанных свойств является снижение частоты и интенсивности головокружений, уменьшение шума в ушах, улучшение слуха в случае его понижения.
**Фармакокинетика**
Абсорбируется быстро, связь с белками плазмы - низкая. Максимальная концентрация в плазме крови через 3 часа. Период полувыведения через 3-4 часа. Практически полностью выводится почками в виде метаболита (2-перидилуксусной кислоты) в течение 24 часов.
**Показания к применению**
- лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного происхождения.
- синдромы, включающие головокружение и головную боль, шум в ушах, прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту.
- болезнь или синдром Меньера.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, дети до 18 лет (в связи с отсутствием данных), беременность и период лактации (в связи с отсутствием данных).

**С осторожностью**: язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки (в том числе в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма. Указанных больных следует регулярно наблюдать в период лечения.

**Беременность и период лактации**

Недостаточно данных для оценки воздействия препарата в период беременности и лактации. В связи с этим не рекомендуется прием при беременности. На время лечения необходимо прекратить грудное вскармливание.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, во время еды.

Таблетки 8 мг: 1-2 таблетки 3 раза в день.

Таблетки 16 мг: ½ - 1 таблетка 3 раза в день.

Таблетка 24 мг: по 1 таблетке 2 раза в день.

Улучшение обычно отмечается уже в начале терапии, стабильный терапевтический эффект наступает после двух недель лечения и может нарастать в течение нескольких месяцев лечения. Лечение длительное. Длительность приёма препарата подбирается индивидуально.

**Побочное действие**

Желудочно-кишечные расстройства, появление реакций повышенной чувствительности со стороны кожных покровов (сыпь, зуд, крапивница), отек Квинке.

**Передозировка**

Симптомы: тошнота, рвота, судороги.

Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами неизвестны.

**Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами**

Бетагистин не обладает седативным эффектом и не влияет на способность управлять автомобилем или заниматься видами деятельности, требующими быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Таблетки 8 мг, 16 мг и 24 мг.

По 15 таблеток в блистер из ПВХ/Al фольги. 2 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Условия хранения**

Список Б.

В сухом месте при температуре не выше 30° С.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

По рецепту.

**Производитель**

Абди Ибрахим Иляч Санайи ве Тидж. А.Ш., Турция

**Адрес Представительства производителя в Москве**

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.47

И.о. директора ИДКЛС Васильев А.Н.

Представитель производителя Кралимарков Х.