

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
РЕПАРЭФ

Торговое наименование: Репарэф.

Международное непатентованное или группировочное наименование: Биен+Гидроксиметилхиноксалиндиоксид.

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения.

Состав

В 1 г содержится: *действующие вещества:* биен - 100 мг, гидроксиметилхиноксалиндиоксид (диоксидин) - 5 мг;

вспомогательные вещества: герани масло эфирное, полисорбат 80, макрогол 1500, макрогол 400.

Описание: однородная мазь от желтого до коричневого цвета со слабым специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа: другие препараты, применяемые в дерматологии.

Код АТХ: D11AX

Фармакологические свойства*Фармакодинамика*

Репарэф – ранозаживляющее средство, стимулирует регенерацию тканей. Действующими веществами мази Репарэф являются биен и диоксидин. Биен – комплекс этиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот, стабилизированный альфа-токоферола ацетатом (витамин Е). В состав биена входят эссенциальные жирные кислоты – арахидоновая (предшественник простагландинов и лейкотриенов), олеиновая, линолевая и линоленовая (витамин F), являющиеся важнейшими компонентами биологических мембран. Гидроксиметилхиноксалиндиоксид (диоксидин) обладает широким спектром противомикробного действия. Применение мази у больных с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки полости рта способствует уменьшению болевого синдрома, снижению воспалительных явлений, уменьшению эритемы, существенному ускорению эпителизации и более быстрому заживлению.

Фармакокинетика

Практически не всасывается через неповрежденную кожу и слизистые оболочки и не попадает в системный кровоток. Через поврежденную кожу и слизистую оболочку всасывается в незначительных количествах.

Показания к применению

Гнойные раны, ожоги различной этиологии и локализации, пролежни, трофические язвы.

В составе комплексной терапии:

Эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки полости рта (травматическое изъязвление, плоский лишай слизистой оболочки полости рта (эрозивно-язвенная форма), рецидивирующий простой герпес губы, рецидивирующий герпетический кератит на этапе пролиферации, рецидивирующий афтозный стоматит, многоформная экссудативная эритема (проявления со стороны слизистой оболочки рта).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к биену, диоксидину и другим компонентам препарата, новообразования кожи и слизистой оболочки полости рта, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Хроническая почечная недостаточность.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Клинические данные о безопасности применения препарата во время беременности и в период лактации отсутствуют. Применение противопоказано.

Способ применения и дозы

Для местного и наружного применения.

Мазь Репарэф наносят тонким слоем на поверхность раны, язвы или ожога после их первичной хирургической обработки и (или) промывания антисептиками. Сверху накладывают стерильную марлевую повязку, пропитанную мазью с внутренней стороны. В зависимости от состояния и площади поврежденного участка аппликацию повторяют 1-2 раза в сутки в течение 4-5 дней.

Для лечения эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта мазь Репарэф применяют местно в виде аппликаций (на ватных или марлевых пластинках) на эрозивные и язвенные поверхности слизистой оболочки полости рта 3-4 раза в день до завершения эпителизации (7-15 дней). Длительность аппликации 5-7 мин.

Побочное действие

Препарат хорошо переносится пациентами. В отдельных случаях после начала лечения мазью Репарэф возможно преходящее ощущение легкого жжения, зуд в месте аппликации.

Редко: развитие околораневого дерматита при длительном применении.

Передозировка

Случаев передозировки при применении мази Репарэф не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

При лечении эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки полости рта прием пищи и напитков рекомендуется не ранее чем через 1-1,5 часа после аппликации мази на пораженные участки.

Следует избегать попадания мази в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой).

При ухудшении течения заболевания или появлении новых симптомов, возникших при лечении мазью, рекомендуется обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения.

По 15, 25, 30 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Республика Беларусь, РУП «Белмедпрепараты»

Юридический адрес:

Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30

Адрес места производства:

Республика Беларусь, 220007 г. Минск, пер. Фабрициуса, 3/11

Владелец регистрационного удостоверения

Республика Беларусь, РУП «Белмедпрепараты»

Организация, принимающая претензии потребителей

Республика Беларусь, РУП «Белмедпрепараты»

Адрес для принятия претензий:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.08.2025 № 20729
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30,

тел./факс: (+375 17) 220-37-16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com