

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Конкор®

наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг
лекарственная форма, дозировка

Мерк Хелскеа КГаА, Германия /ООО «Нанолек», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » 280820 г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Частота побочных реакций, приведенных ниже, определялась соответственно следующему: - очень часто $\geq 1/10$; - часто $\geq 1/100$, $< 1/10$; - нечасто $\geq 1/1000$, $< 1/100$; - редко $\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$; - очень редко $< 1/10\ 000$. <u>Нарушения психики</u> Нечасто: депрессия, бессонница. Редко: галлюцинации, ночные кошмары. <u>Нарушения со стороны нервной системы</u> Часто: головокружение*, головная боль*. Редко: потеря сознания. <u>Нарушения со стороны органа зрения</u> Редко: уменьшение слезотечения (следует учитывать при ношении контактных линз). Очень редко: конъюнктивит.	Побочное действие Частота побочных реакций, приведенных ниже, определялась соответственно следующему: - очень часто $\geq 1/10$; - часто $\geq 1/100$, $< 1/10$; - нечасто $\geq 1/1000$, $< 1/100$; - редко $\geq 1/10\ 000$, $< 1/1000$; - очень редко $< 1/10\ 000$. <u>Нарушения психики</u> Нечасто: депрессия, бессонница. Редко: галлюцинации, ночные кошмары. <u>Нарушения со стороны нервной системы</u> Часто: головокружение*, головная боль*. Редко: потеря сознания. <u>Нарушения со стороны органа зрения</u> Редко: уменьшение слезотечения (следует учитывать при ношении контактных линз). Очень редко: конъюнктивит.

Старая редакция	Новая редакция
<u>Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения</u>	<u>Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения</u>
Редко: нарушения слуха.	Редко: нарушения слуха.
<u>Нарушения со стороны сердца</u>	<u>Нарушения со стороны сердца</u>
Очень часто: брадикардия (у пациентов с ХСН).	Очень часто: брадикардия (у пациентов с ХСН).
Часто: усугубление симптомов течения ХСН (у пациентов с ХСН).	Часто: усугубление симптомов течения ХСН (у пациентов с ХСН).
Нечасто: нарушение АВ проводимости, брадикардия (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией), усугубление симптомов течения ХСН (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией).	Нечасто: нарушение АВ проводимости, брадикардия (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией), усугубление симптомов течения ХСН (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией).
<u>Нарушения со стороны сосудов</u>	<u>Нарушения со стороны сосудов</u>
Часто: ощущение похолодания или онемения в конечностях, выраженное снижение АД, особенно у пациентов с ХСН.	Часто: ощущение похолодания или онемения в конечностях, выраженное снижение АД, особенно у пациентов с ХСН.
Нечасто: ортостатическая гипотензия.	Нечасто: ортостатическая гипотензия.
<u>Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения</u>	<u>Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения</u>
Нечасто: бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или обструкцией дыхательных путей в анамнезе.	Нечасто: бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или обструкцией дыхательных путей в анамнезе.
Редко: аллергический ринит.	Редко: аллергический ринит.
<u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</u>	<u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</u>
Часто: тошнота, рвота, диарея, запор.	Часто: тошнота, рвота, диарея, запор.
<u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей</u>	<u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей</u>
Редко: гепатит.	Редко: гепатит.
<u>Нарушения со стороны кожи и подкожных</u>	<u>Нарушения со стороны кожи и подкожных</u>

Старая редакция	Новая редакция
<u>тканей</u> Редко: реакции повышенной чувствительности, такие как кожный зуд, сыпь, гиперемия кожных покровов. Очень редко: алоpecia. Бета-адреноблокаторы могут способствовать обострению симптомов течения псориаза или вызывать псориазоподобную сыпь. <u>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани</u> Нечасто: мышечная слабость, судороги мышц. <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы</u> Редко: эректильная дисфункция. <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения</u> Часто: астения (у пациентов с ХСН), повышенная утомляемость*. Нечасто: астения (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией). <u>Лабораторные и инструментальные данные</u> Редко: повышение концентрации триглицеридов и активности «печеночных» трансаминаз в крови (аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ)). * У пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией особенно часто данные симптомы появляются в начале курса лечения. Обычно эти явления носят легкий характер и проходят, как правило, в течение 1-2 недель после начала лечения.	<u>тканей</u> Редко: реакции повышенной чувствительности, такие как кожный зуд, сыпь, гиперемия кожных покровов и ангионевротический отёк. Очень редко: алоpecia. Бета-адреноблокаторы могут способствовать обострению симптомов течения псориаза или вызывать псориазоподобную сыпь. <u>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани</u> Нечасто: мышечная слабость, судороги мышц. <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы</u> Редко: эректильная дисфункция. <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения</u> Часто: астения (у пациентов с ХСН), повышенная утомляемость*. Нечасто: астения (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией). <u>Лабораторные и инструментальные данные</u> Редко: повышение концентрации триглицеридов и активности «печеночных» трансаминаз в крови (аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ)). * У пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией особенно часто данные симптомы появляются в начале курса лечения. Обычно эти явления носят легкий характер и проходят, как правило, в течение

Старая редакция	Новая редакция
	1-2 недель после начала лечения.

Менеджер по регуляторным вопросам
в России и СНГ



В.Ю. Шаповалова