


ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА



Конкор® Кор

наименование лекарственного препарата

таблетки покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг
лекарственная форма, дозировка

Мерк Хелскеа КГаА, Германия /ООО «Нанолек», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

280820

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Побочное действие Частота побочных реакций, приведенных ниже, определялась соответственно следующему: - очень часто $\geq 1/10$; - часто $\geq 1/100$, $<1/10$; - нечасто $\geq 1/1000$, $<1/100$; - редко $\geq 1/10\ 000$, $<1/1000$; - очень редко $\leq 1/10\ 000$. <u>Нарушения психики</u> Нечасто: депрессия, бессонница. Редко: галлюцинации, ночные кошмары. <u>Нарушения со стороны нервной системы</u> Часто: головокружение, головная боль. Редко: потеря сознания. <u>Нарушения со стороны органа зрения</u> Редко: уменьшение слезотечения (следует учитывать при ношении контактных линз).	Побочное действие Частота побочных реакций, приведенных ниже, определялась соответственно следующему: - очень часто $\geq 1/10$; - часто $\geq 1/100$, $<1/10$; - нечасто $\geq 1/1000$, $<1/100$; - редко $\geq 1/10\ 000$, $<1/1000$; - очень редко $\leq 1/10\ 000$. <u>Нарушения психики</u> Нечасто: депрессия, бессонница. Редко: галлюцинации, ночные кошмары. <u>Нарушения со стороны нервной системы</u> Часто: головокружение, головная боль. Редко: потеря сознания. <u>Нарушения со стороны органа зрения</u> Редко: уменьшение слезотечения (следует учитывать при ношении контактных линз).

Старая редакция	Новая редакция
Очень редко: конъюнктивит. <u>Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения</u> Редко: нарушения слуха. <u>Нарушения со стороны сердца</u> Очень часто: брадикардия. Часто: усугубление симптомов течения ХСН. Нечасто: нарушение АВ проводимости. <u>Нарушения со стороны сосудов</u> Часто: ощущение похолодания или онемения в конечностях, выраженное снижение АД. Нечасто: ортостатическая гипотензия. <u>Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения</u> Нечасто: бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или обструкцией дыхательных путей в анамнезе. Редко: аллергический ринит. <u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</u> Часто: тошнота, рвота, диарея, запор. <u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей</u> Редко: гепатит. <u>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей</u> Редко: реакции повышенной чувствительности, такие как кожный зуд, сыпь, гиперемия кожных покровов. Очень редко: алоpecia. Бета-адреноблокаторы могут способствовать обострению симптомов псориаза или	Очень редко: конъюнктивит. <u>Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения</u> Редко: нарушения слуха. <u>Нарушения со стороны сердца</u> Очень часто: брадикардия. Часто: усугубление симптомов течения ХСН. Нечасто: нарушение АВ проводимости. <u>Нарушения со стороны сосудов</u> Часто: ощущение похолодания или онемения в конечностях, выраженное снижение АД. Нечасто: ортостатическая гипотензия. <u>Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения</u> Нечасто: бронхоспазм у пациентов с бронхиальной астмой или обструкцией дыхательных путей в анамнезе. Редко: аллергический ринит. <u>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</u> Часто: тошнота, рвота, диарея, запор. <u>Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей</u> Редко: гепатит. <u>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей</u> Редко: реакции повышенной чувствительности, такие как кожный зуд, сыпь, гиперемия кожных покровов и ангионевротический отёк. Очень редко: алоpecia. Бета-адреноблокаторы могут способствовать

Старая редакция	Новая редакция
вызывать псориазоподобную сыпь. <u>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани</u> Нечасто: мышечная слабость, судороги мышц. <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы</u> Редко: эректильная дисфункция. <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения</u> Часто: астения, повышенная утомляемость. <u>Лабораторные и инструментальные данные</u> Редко: повышение концентрации триглицеридов и активности «печеночных» трансаминаз в крови (аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ)).	обострению симптомов псориаза или вызывать псориазоподобную сыпь. <u>Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани</u> Нечасто: мышечная слабость, судороги мышц. <u>Нарушения со стороны половых органов и молочной железы</u> Редко: эректильная дисфункция. <u>Общие расстройства и нарушения в месте введения</u> Часто: астения, повышенная утомляемость. <u>Лабораторные и инструментальные данные</u> Редко: повышение концентрации триглицеридов и активности «печеночных» трансаминаз в крови (аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ)).

Менеджер по регуляторным вопросам
в России и СНГ



В.Ю. Шаповалова