

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФЛОРИН® ФОРТЕ

Регистрационный номер

Торговое наименование ФЛОРИН® ФОРТЕ

Международное непатентованное или группировочное наименование

Бифидобактерии бифидум + Лактобактерии плантарум

Лекарственная форма Порошок для приема внутрь

Состав

Одна капсула содержит:

действующие вещества: бифидобактерии *B.bifidum* №1, сорбированные на активированном угле – не менее 50 млн (5x10⁷) КОЕ*, лактобактерии *L. plantarum* 8P-A3 – не менее 50 млн (5x10⁷) КОЕ,

вспомогательное вещество: лактозы моногидрат – до 0,85 г.

*КОЕ – колониеобразующая единица

Описание

Порошок со слабым кисломолочным запахом светло-серого или темно-серого цвета с черными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Противодиарейные, кишечные противовоспалительные/ противомикробные препараты; противодиарейные микроорганизмы

Код АТХ: A07FA

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакодинамика

Флорин® форте восстанавливает нормальную микрофлору организма человека, подавляет жизнедеятельность возбудителей инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей за счет входящих в препарат живых пробиотических бактерий: бифидобактерий (*Bifidobacterium bifidum*), сорбированных в виде микроколоний, и лактобактерий (*Lactobacillus plantarum*).

Сочетанное действие сорбированных на активированном угле в виде микроколоний бифидобактерий и лактобактерий обеспечивает ускоренную нормализацию количественного и качественного состава, метаболической и функциональной активности микрофлоры, усиление подавляющего воздействия на возбудителей острых кишечных инфекций, острых респираторно-вирусных инфекций и выведение их из организма, повышает неспецифическую резистентность организма.

Бифидобактерии, входящие в состав препарата, обладают антимикробным действием за счет антагонистической активности к патогенным и условно патогенным микроорганизмам, иммуномодулирующим действием – стимулируют синтез иммуноглобулинов, интерферонов, цитокинов, участвуют в формировании местного иммунитета, активизируют репарацию слизистых оболочек и пристеночное пищеварение, продуцируют ферменты, короткоцепочечные жирные кислоты, молочную кислоту. Бифидобактерии являются биосорбентом, нейтрализуют токсины, аккумулируют токсические вещества и выводят их из организма.

Лактобактерии подавляют рост возбудителей заболеваний за счет продуцирования молочной кислоты, перекиси водорода, лизоцима, участвуют в метаболизме белков, жиров, углеводов, нуклеиновых и желчных кислот, активизируют работу иммунной системы, препятствуют формированию затяжных форм кишечных заболеваний за счет повышения общей резистентности организма. Лактобактерии обладают гипохолестеринемическим действием, снижают окислительно-восстановительный потенциал, связывают вредные для бифидобактерий радикалы кислорода.

Лактобактерии и бифидобактерии оказывают усиленное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку, продуцируют антибиотикоподобные вещества – бактериоцины, участвуют в синтезе витаминов, используют лактозу в процессе жизнедеятельности в качестве основного источника питания.

Фармакокинетика

Не всасывается в системный кровоток.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек;
- острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами и/или условно патогенной микрофлорой;
- острые кишечные инфекции неустановленной этиологии;
- острые респираторные заболевания как вирусного, так и микробного происхождения;
- хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно патогенных микроорганизмов в высоких титрах;
- восстановление нормофлоры кишечника в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний;
- дисбактериозы различной этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Врожденная недостаточность лактазы. Нарушение всасывания глюкозы-галактозы.
Индивидуальная непереносимость препарата.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ

Флорин[®] форте разрешен для применения женщинам в периоды беременности и грудного вскармливания. Особых условий приема нет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Препарат предназначен к применению у взрослых и детей с первых дней жизни (в том числе недоношенных).

Возрастные дозировки:

- взрослым по 2 пакета 3 раза в сутки,
- детям в возрасте до 6 месяцев по 1 пакету 2 раза в сутки,
- детям с 6 месяцев до 3 лет по 1 пакету 3 раза в сутки,
- детям с 3-х лет и старше по 1 пакету 3 – 4 раза в сутки.

Курс лечения:

- при заболеваниях, сопровождающихся нарушением нормальной микрофлоры кишечника 10 – 15 дней,
- при острых кишечных инфекциях 5 – 7 дней,
- при острых респираторных заболеваниях 5 – 10 дней,
- при хронических заболеваниях ЖКТ 10 – 15 дней,
- в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний 10 – 15 дней,
- при дисбактериозах 10 – 15 дней.

Флорин[®] форте принимают во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи. Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста – с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Не установлены.

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Случаев передозировки не наблюдалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

При одновременном приеме Флорина® форте с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается. При приеме антибиотиков рекомендованный интервал между приемом антибиотика и препарата Флорин® форте составляет 3 – 4 часа.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Содержит лактозу.

Данный лекарственный препарат не следует принимать пациентам с редко встречающейся наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы лопарей или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕХАНИЗМАМИ

Флорин форте® не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок для приема внутрь

По 0,85 г в пакеты из многослойного металлополимерного материала. По 10, 20 или 30 пакетов с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Хранить в недоступном для детей месте

УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения/ организация,
принимающая претензии от потребителей**

Общество с ограниченной ответственностью «АВАН-БИО», 127018, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Марьино, ул. Сушецкий Вал, 16, стр. 5

Тел.: +7 (495) 269-03-10, e-mail: info@avan-bio.ru

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «ПроБиоФарм».

Адрес:

143981, Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Южная, д. 11.