

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ФУКОРЦИН

Регистрационный номер

Торговое наименование
Фукорцин

Группировочное наименование
Борная кислота + Резорцинол + Фенол + Фуксин основной

Лекарственная форма
Раствор для наружного применения

Состав на 1 мл:

Действующие вещества:

Фуксин основной	- 0,004 г
Борная кислота	- 0,008 г
Фенол	- 0,039 г
Резорцинол	- 0,078 г

Вспомогательные вещества:

Ацетон	- 0,049 мл
Этанол (спирт этиловый) 95 %	- 0,096 мл
Вода очищенная	- до 1 мл

Описание

Жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептики и дезинфицирующие средства; препараты борной кислоты

Код АТХ D08AD

Фармакологические свойства

Обладает антисептическим и противогрибковым действием.

Показания к применению

Препарат Фукорцин показан к применению у взрослых и детей от 0 до 18 лет при гнойничковых и грибковых заболеваниях кожи, поверхностных ранах, эрозии, трещинах, ссадинах кожи.

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующим веществам (фуксин основной, борная кислота, фенол, резорцинол) или к любому из вспомогательных веществ;
- беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не рекомендуется применять женщинам в периоды беременности и грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые

Раствор наносят с помощью ватного тампона или кисточки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После подсыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Дети

От 0 до 18 лет

Режим дозирования у детей не отличается от режима дозирования для взрослых.

Способ применения

Наружно.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Кратковременное ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При длительном применении или нанесении на обширные участки кожи, а также при случайном проглатывании, возможно токсическое отравление в виде головокружения, слабости, расстройства дыхания. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

Особые указания

Препарат не следует наносить на обширные участки кожи, слизистые оболочки, т.к. фенол, входящий в состав раствора, проникает в кровь и может вызвать токсические явления (головокружение, слабость, расстройство дыхания). При случайном попадании в глаза немедленно промыть обильно водой. Следует учитывать, что препарат имеет красный цвет и может окрашивать белье.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для наружного применения.

По 10 мл, 25 мл или 50 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или

полиэтилентерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления, или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления;

или по 10 мл, 25 мл или 50 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата и крышками навинчиваемыми с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления;

или по 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата с контролем первого вскрытия, или без контроля первого вскрытия; или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата и крышками навинчиваемыми с защитой от детей или без защиты от детей из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия;

или по 50 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных крышками навинчиваемыми с уплотнительным элементом из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата с контролем первого вскрытия, или без контроля первого вскрытия; или укупоренных пробками из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата и крышками навинчиваемыми с защитой от детей или без защиты от детей из полиэтилена высокого давления или низкого давления, или полипропилена, или полиэтиленотерефталата, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия;

или по 10 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных крышками навинчиваемыми из полипропилена или полиэтилена, или полиэтиленотерефталата, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления.

Крышки навинчиваемые допускается комплектовать вспомогательными элементами – лопаточкой или кисточкой.

Каждый флакон/флакон-капельницу помещают в пачку картонную. Инструкцию по медицинскому применению вкладывают в пачку картонную. Допускается вложение в пачку аппликатора для нанесения препарата.

Упаковка для стационаров.

По 40, 54, 66 или 70 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку (коробку картонную).

По 1,0 кг в бутылках стеклянных с винтовой горловиной, укупоренных крышками из полипропилена, или полиэтилена высокой плотности или низкой плотности, или смеси полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления.

По 5,0 кг, 8,0 кг или 10,0 кг в канистрах полимерных из полиэтилена низкого давления с навинчивающимися крышками без предохранительного кольца или с предохранительным кольцом.

По 18,0 кг в канистрах полимерных из полиэтилена низкого давления с навинчивающимися крышками без предохранительного кольца или с предохранительным кольцом.

Бутыли и канистры дополнительно снабжают инструкциями по медицинскому применению (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «ДАНСОН-РУ»

Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1, ком.220; Тел: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»,

Российская Федерация, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5

Тел: (4852) 44-38-56

e-mail: farmfab@yaroslavl.ru

Директор ЗАО «ЯФФ»



Юдина Е.В.