

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФУКОРЦИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: ФУКОРЦИН

Международное непатентованное или группировочное наименование: борная кислота + резорцинол + фенол + краситель фуксин основной.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Состав

Действующие вещества: борная кислота - 0,8 г, краситель фуксин основной - 0,4 г, фенол - 3,9 г, резорцинол - 7,8 г, вспомогательные вещества: ацетон - 4,9 г, этанол 95 % - 9,6 мл, вода очищенная до 100 мл.

Описание: жидкость темно-красного цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; препараты борной кислоты.

Код АТХ: D08AD

Фармакологические свойства

Обладает антисептическим и противогрибковым действием.

Показания к применению

Гнойничковые и грибковые заболевания кожи, поверхностные раны, эрозии, трещины, ссадины кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность к борной кислоте, фенолу, резорцинолу, красителю фуксин основной или к любому из вспомогательных веществ, беременность, период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение препарата противопоказано при беременности.

Лактация

Применение препарата противопоказано в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно. Раствор наносят с помощью тампона или стеклянной палочки на пораженные участки кожи 2-4 раза в день. После высыхания жидкости на обработанный участок можно наносить мази и пасты.

Побочное действие

Местные реакции; возможно (особенно у детей) ощущение жжения и боли, которое проходит самостоятельно и не требует отмены препарата.

Передозировка

Симптомы

При длительном использовании фукорцина и использовании его на обширных участках кожи возможна передозировка препарата, что сопровождается явлениями, характерными для отравления фенолом (головокружением, слабостью, нарушением дыхания).

Лечение

В случае возникновения таких явлений необходимо дать больному доступ свежего воздуха, провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не изучалось.

Особые указания

Не следует наносить препарат на большие участки кожи, так как фенол, входящий в состав препарата, может проникать в кровь и вызывать токсические явления (головокружение, слабость, расстройство дыхания). Препарат имеет своеобразный запах и красный цвет и может пачкать белье.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения.

По 10 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной в комплекте с укупорочными средствами или укупоренными крышками полиэтиленовыми резьбовыми (с уплотняющим элементом и помазком) или крышками полиэтиленовыми резьбовыми без помазка.

По 10, 15 или 25 мл во флаконы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми с крышками навинчиваемыми; или укупоренные крышками навинчиваемыми с уплотнительными элементами, или укупоренными крышками полиэтиленовыми резьбовыми (с уплотняющим элементом и помазком); или во флаконы полимерные, укупоренные пробками полимерными или пробками с уплотнительными элементами и крышками полимерными.

Или по 10, 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробками с уплотнительными элементами, пробками – капельницами и крышками навинчиваемыми, укупоренные крышками и пробками полимерными, или укупоренные пробками с навинчиваемыми крышками;

По 10, 15, 25 мл во флаконы полимерные в комплекте с крышкой и дозатором, или во флаконы полимерные с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами или по 10, 15, 25 мл во флаконы-капельницы полимерные, по 10, 15 мл во флаконы-капельницы полимерные в комплекте с крышками навинчиваемыми и пробками-капельницами.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящиеся этикетки, или текст этикетки наносят непосредственно на флаконы.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную из картона коробочного или запаивают в полиэтиленовый пакет.

Допускается упаковка флаконов, флаконов-капельниц вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (коробку картонную) (для стационаров).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 99Б.

ОАО «Самарамедпром», Россия, Самарская обл., Волжский район, пгт. Петра Дубрава, на территории завода «Коммунар», здание № 2.

ОАО «Самарамедпром», Россия, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Женел РД», Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское, ул. Православная, д. 70.

Организация, принимающая претензии потребителей

ОАО «Самарамедпром», Россия, 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Партизанская, д. 86.

Тел./факс: (846) 373-81-07, (846) 373-81-08.