ЛП-№(013070)-(РГ-RU) от 30.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32417
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

СТАБИКАРДИН®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СТАБИКАРДИН®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Боярышника плодов экстракт + Крапивы двудомной листьев экстракт + Ландыша травы настойка

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Состав на 100 мл препарата

Ландыша настойка	–	10 мл
Боярышника экстракт жидкий	–	30 мл
Крапивы двудомной экстракт жидкий	–	60 мл

Описание

Жидкость от зеленовато-коричневого до коричневого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается появление незначительного осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения заболеваний сердца; другие препараты для лечения заболеваний сердца; другие комбинированные препараты для лечения заболеваний сердца.

Код АТХ

C01EX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения.

Обладает умеренным кардиотоническим и седативным действием, уменьшает возбудимость сердечной мышцы.

Фармакокинетика

При приеме внутрь быстро всасывается, и его максимальная концентрация (по анализу спирта в крови) достигается в течение 5-7 минут. Период распределения по органам

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32417
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

и тканям (по анализам флавоноидов) составляет 55-100 минут. Период полувыведения препарата из организма составляет 95-105 минут.

Показания к применению

Функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы (кардиалгия, аритмия), невротические состояния, вегетативная лабильность. В качестве седативного средства в гериатрии (пациентам старше 60 лет).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная свертываемость крови, кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, эндокардит, миокардит, атриовентрикулярная блокада II и III степени, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, почечная недостаточность, атриовентрикулярная блокада I степени, эпилепсия.

Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Внутрь, в виде раствора, который готовят перед применением путем разведения 1 чайной ложки препарата тремя чайными ложками кипяченой воды. Принимают по 1 чайной ложке приготовленного раствора 3 раза в день за 25-30 мин до еды. Курс лечения 15-25 дней. Целесообразность проведения повторных курсов определяется врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (крапивница, кожный зуд), тошнота, рвота, диарея, мышечная слабость, головная боль.

*Если у Вас отмечаются эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу**.*

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32417
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение симптоматическое.

При применении препарата в больших дозах возможны сонливость, снижение артериального давления, аритмия, редко – головокружение, которые проходят при снижении дозы препарата или его отмене.

При длительном приеме препарата в больших дозах могут отмечаться жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При комбинированном применении препарата с сердечными гликозидами (дигоксин, строфантин и др.) происходит усиление кардиотонического эффекта, с бета-адреноблокаторами – усиление гипотензивного эффекта.

Особые указания

Препарат содержит от 45,0 до 62,0 % этанола. В максимальной разовой дозе препарата (1 ч. л. раствора, приготовленного перед применением) содержание абсолютного этилового спирта (этанола) составляет около 0,6 г, в максимальной суточной дозе препарата (3 ч. л. раствора, приготовленного перед применением) – около 1,8 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата следует воздерживаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь.

По 25 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками из полиэтилена высокого давления и крышками навинчиваемыми белого цвета из полиэтилена высокого или низкого давления или крышками укупорочно-винтовыми белого цвета из полиэтилена низкого давления.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 26.12.2025 № 32417
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.