

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

БРИВИАК

торговое наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

10 мг, 25 мг, 50 мг, 75 мг, 100 мг

лекарственная форма, дозировка

ЮСБ Фарма СА, Бельгия

наименование производителя, страна

МИНЗДРАВ РОССИИ

11-04084-020621

СОГЛАСОВАНО

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «020621» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<u>Фармакокинетические взаимодействия</u> <i>Влияние других препаратов на фармакокинетику бриварацетама</i> Бриварацетам характеризуется низким потенциалом к участию в межлекарственных взаимодействиях <i>in vitro</i>. Основной путь биотрансформации бриварацетама заключается в СYP-независимом гидролизе. Второй путь биотрансформации включает гидроксилирование, опосредованное изоферментом СYP2C19 (см. раздел «Фармакокинетика»). Возможно повышение концентрации бриварацетама при его комбинировании с мощными ингибиторами изофермента СYP2C19 (флуконазолом, флувоксамином), однако риск клинически значимого взаимодействия, опосредованного изоферментом СYP2C19, считается низким.	<u>Фармакокинетические взаимодействия</u> <i>Влияние других препаратов на фармакокинетику бриварацетама</i> Бриварацетам характеризуется низким потенциалом к участию в межлекарственных взаимодействиях <i>in vitro</i>. Основной путь биотрансформации бриварацетама заключается в СYP-независимом гидролизе. Второй путь биотрансформации включает гидроксилирование, опосредованное изоферментом СYP2C19 (см. раздел «Фармакокинетика»). Возможно повышение концентрации бриварацетама при его комбинировании с мощными ингибиторами изофермента СYP2C19 (флуконазолом, флувоксамином), однако риск клинически значимого взаимодействия, опосредованного изоферментом СYP2C19, считается низким. Имеются ограниченные данные клинического применения, свидетельствующие о том, что одновременное применение бриварацетама с каннабидиолом может приводить к повышению экспозиции бриварацетама в плазме крови (возможно, за счет

135672

	ингибирования	СУР2С19),	однако
	клиническая	значимость	этого
	взаимодействия остается неясной.		



Представитель компании



[Handwritten signature]

подпись

Павловская О. П.



135672