

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Бриллиантовый зеленый**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование**

Бриллиантовый зеленый

**Международное непатентованное или группировочное наименование**

Бриллиантовый зеленый

**Лекарственная форма**

Раствор для наружного применения спиртовой.

**Состав на 100 мл**

*Действующее вещество:* Бриллиантовый зеленый - 1 г

*Вспомогательные вещества:* этанол (спирт этиловый) 95 % - 56 г, вода очищенная до 100 мл.

**Описание**

Прозрачная интенсивно зеленого цвета жидкость с запахом спирта.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

**Код АТХ: D08AX**

**Фармакологические свойства**

Антисептический препарат (активен в отношении грамположительных бактерий).

**Показания к применению**

Препарат Бриллиантовый зеленый показан к применению у взрослых пациентов и у детей от 0 до 18 лет для лечения следующих состояний:

Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит, блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность к бриллиантовому зеленому или к любому из вспомогательных веществ.

### **С осторожностью**

Беременность, период грудного вскармливания, блефарит, мейбомит, детский возраст до 3 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

По имеющимся данным при правильном применении препарат Бриллиантовый зеленый можно применять при беременности и в период грудного вскармливания, однако, при его применении при беременности и в период грудного вскармливания следует соблюдать осторожность. Не допускается применение препарата на кожу сосков.

### **Способ применения и дозы**

Наружно, наносят непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки!

Если после лечения улучшения не наступает, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата. Вы должны обратиться к врачу, если симптомы ухудшаются или не улучшаются после 2-3 дней лечения.

### **Побочное действие**

Жжение в месте нанесения, при попадании на слизистую оболочку глаза – жжение, слезотечение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **Передозировка**

Данные отсутствуют.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими йод, хлор, щелочи (в т.ч. раствор аммиака).

### **Особые указания**

Не следует допускать попадания препарата на слизистые оболочки, т.к. спирт, содержащийся в составе препарата, может вызвать ожоги слизистых и/или сильное раздражение.

Не допускать попадания препарата в глаза!

Активность лекарственного препарата Бриллиантовый зеленый существенно снижается в присутствии сыворотки крови.

Внимательно прочтите инструкцию перед тем, как начать применение препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

При правильном применении не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами, работать с механизмами.

#### **Форма выпуска**

Раствор для наружного применения спиртовой 1 %.

По 10 мл, 25 мл во флаконы – капельницы темного стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и/или крышками навинчиваемыми, или крышками укупорочно – навинчиваемыми, или крышкой в комплекте с лопаточкой.

По 25 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и/или крышками навинчиваемыми, или крышками укупорочно – навинчиваемыми, или крышкой в комплекте с лопаточкой.

По 10 мл, 100 мл во флаконы – капельницы полимерные в комплекте с крышкой навинчиваемой (КН – 3) и пробкой – капельницей (ПК – 3).

По 10 мл, 25 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл, 1000 мл во флаконы из полиэтилена, укупоренные пробками полиэтиленовыми и/или крышками навинчиваемыми, или крышками укупорочно – навинчиваемыми, или крышкой в комплекте с лопаточкой.

Каждый флакон, флакон – капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается наносить на пачку текст инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

Допускается упаковка флаконов, флаконов - капельниц по 30 шт, 60 шт, 64 шт, 96 шт без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в ящик из гофрированного картона или коробку из картона и комбинированных материалов (Для стационаров).

По 1 л в полиэтиленовые бутылки (Для стационаров).

По 1 л, 10 л, 20 л в полиэтиленовые канистры (Для стационаров).

**Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 2 года.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска:** Отпускают без рецепта.

**Владелец регистрационного удостоверения**

АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия

650055, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, проспект Кузнецкий,  
зд. 121в

Тел/факс (3842) 28-72-50

**Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей:**

АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия

650055, Кемеровская область – Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, проспект Кузнецкий,  
зд. 121в

Тел/факс (3842) 28-72-50