

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Бонафтон®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Бонафтон®

Международное непатентованное или группировочное наименование:
бромнафтохинон

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав:

100 г препарата содержат:

Действующее вещество:

Бромнафтохинон – 0,5 г.

Вспомогательное вещество:

Вазелин – до 100 г.

Описание

Однородная мазь от оранжевого до буровато-оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ: D06BB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противовирусный препарат, активен в отношении вируса *Herpes simplex* и некоторых аденовирусов. Подавляет синтез цитоплазматических белков, включающихся в состав капсидов, и нарушает транспорт компонентов вирусного капсида в клеточное ядро, где осуществляется их «сборка».

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата отсутствуют.

Показания к применению

Вирусные заболевания кожи, слизистых оболочек полости рта и гениталий (герпес простой, опоясывающий; кондилома остроконечная), герпетический стоматит и гингивит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Беременность и период лактации.

Детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Местно, наружно.

При простом и опоясывающем герпесе препарат наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 3-4 раза в сутки (в области гениталий - 4-6 аппликаций в день). Лечение проводят 3 циклами по 5 дней с 1-2 - дневными перерывами или 2 цикла по 10 дней с 3-5 - дневным перерывом. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта препарат наносят на пораженные участки тонким слоем 4-6 раз в день (курс лечения - 3-20 дней в зависимости от тяжести заболевания).

Для лечения остроконечных кондилом применяют препарат 2 раза в сутки в течение 2 недель.

Побочные действия

Аллергические реакции. Дерматит.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Фармакологического взаимодействия с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Препарат предназначен только для местного и наружного применения.

Избегать попадания на слизистые оболочки глаз.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и т.п.).

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения 0,5 %.

По 15 г или 25 г в тубы алюминиевые. Каждую тубу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Срок годности

2 года. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

По рецепту.

**Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Адрес места
производства/Организация, принимающая претензии потребителей**

Акционерное общество "Муромский приборостроительный завод" (АО «МПЗ»), Россия
602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а,
факс (49234) 6-02-52, тел.6-34-71

Представитель АО «МПЗ»,
начальник ОЛС



И.М. Шашуркина