МИНЗДРАВ РОССИИ
РК-002275/02-210720
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Будесонид-натив
раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия
ООО «Натива», Россия

Изменение № 11

Дата внесения Изменения «____» 210720 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
При производстве препарата на ООО «Натива», Россия, указывают: **Форма выпуска** Раствор для ингаляций 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл. По 2 мл во флаконы для лекарственных средств или во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми, обжатые колпачками алюминиевыми или алюминиево-пластиковыми. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. *Или, при производстве препарата на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия, указывают:* **Форма выпуска** Раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл. По 2 мл во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные колпачками комбинированными с элементом эластомерным или пробками из бутилкаучука, ламинированного или	*При производстве препарата на ООО «Натива», Россия, указывают:* **Форма выпуска** Раствор для ингаляций 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл. По 2 мл во флаконы для лекарственных средств или во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные пробками резиновыми, обжатые колпачками алюминиевыми или алюминиево-пластиковыми. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с разделительными перегородками из картона. *Или, при производстве препарата на ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», Россия, указывают:* **Форма выпуска** Раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл. По 2 мл во флаконы из бесцветного стекла, укупоренные колпачками комбинированными с элементом эластомерным или пробками из

Старая редакция	Новая редакция
неламинированного фторполимером, обжатые алюминиевыми или алюминиево-пластиковыми колпачками. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	бутилкаучука, ламинированного или неламинированного фторполимером, обжатые алюминиевыми или алюминиево-пластиковыми колпачками. По 10 флаконов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку с разделительными перегородками из картона.

Представитель
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА» Е.В. Толстова