

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКИ

(Sambuci nigrae flores)

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Бузины черной цветки.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Бузины черной цветки.

Лекарственная форма.

Цветки порошок.

Состав.

Бузины черной цветки.

Характеристика.

Цветки бузины содержат флавоноиды, эфирное масло, гликозид самбунигрин и др.

Описание.

Смесь частиц цветков, бутонов и цветоножек. Цвет желтоватый или желтый с беловато-серыми, зеленовато-серыми, коричневатозелеными, коричневыми вкраплениями. Запах характерный. Вкус водного извлечения пряный.

Фармакотерапевтическая группа.

Потогонное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой из цветков бузины черной оказывает потогонное действие.

Показания к применению.

Острые респираторные вирусные инфекции, в том числе грипп (симптоматическая терапия).

Противопоказания.

Индивидуальная непереносимость. Детский возраст до 12 лет. Беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин. Фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл. Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Возможный курс лечения 1-2 недели. Перед применением настоев рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Потогонному действию препарата способствует обильное теплое питье. Если при применении препарата симптомы сохраняются более 24 часов или ухудшаются, то следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Цветки порошок. По 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/Держатель регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А,
телефон +7 (495) 566-00-14, E-mail: sales@lektrava.ru