МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001032- 110215
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка и гепатита В адсорбированная (Вакцина АКДС-Геп В)

суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» 110215 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: в одной прививочной дозе (0,5 мл): 15 флокулирующих единиц (Lf) дифтерийного анатоксина, 5 единиц связывания (ЕС) столбнячного анатоксина, 10 млрд коклюшных бактерий, 5 мкг HBsAg, от 0,3 до 0,55 мг алюминия гидроксида в пересчете на алюминий (Al^{+3}) и не более 50 мкг формальдегида. Консервант - тиомерсал от 35 до 50 мкг.	*Состав.* В 1 дозе (0,5 мл) содержится: *Препарат с консервантом* Действующие вещества: Анатоксин дифтерийный – 15 флокулирующих единиц (Lf); Анатоксин столбнячный – 5 единиц связывания (ЕС); Инактивированные коклюшные бактерии – 10 млрд; HBsAg – 5 мкг. Вспомогательные вещества: Алюминия гидроксид (в пересчете на алюминий Al^{3+}) – от 0,3 до 0,55 мг;

Старая редакция	Новая редакция
	Формальдегид – не более 50 мкг; Консервант – тиомерсал – от 35 до 50 мкг. *Препарат без консерванта* Действующие вещества: Анатоксин дифтерийный – 15 флокулирующих единиц (Lf); Анатоксин столбнячный – 5 единиц связывания (ЕС); Инактивированные коклюшные бактерии – 10 млрд; HBsAg – 5 мкг. Вспомогательные вещества: Алюминия гидроксид (в пересчете на алюминий Al^{3+}) – от 0,3 до 0,55 мг; Формальдегид – не более 50 мкг.
Условия транспортирования. При температуре от 2 до 8 °С В соответствии с СП 3.3.2.1248-03. Замораживание не допускается.	**Условия транспортирования.** При температуре от 2 до 8 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248-03. Замораживание не допускается.

Первый заместитель
генерального директора
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России

В.Ф. Руденко