МИНЗДРАВ РОССИИ
№ N015312/01- 181213
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Энцепур® детский
(Вакцина против клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная жидкая с адъювантом)
наименование лекарственного препарата

суспензия для внутримышечного введения, 0,25 мл/доза
лекарственная форма, дозировка

Новартис Вакцинс энд Диагностикс ГмбХ и Ко.КГ, Германия
наименование производителя, страна

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

Дата внесения Изменения «____» 181213 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Противопоказания 1. Острые лихорадочные состояния любой этиологии или обострение хронических инфекционных заболеваний. Прививки проводятся не ранее, чем через 2 недели после исчезновения признаков острого заболевания (нормализации температуры тела). 2. Наличие гиперчувствительности к активному	**Противопоказания** 1. Острые лихорадочные состояния любой этиологии или обострение хронических инфекционных заболеваний. Прививки проводятся не ранее, чем через 2 недели после исчезновения признаков острого заболевания (нормализации температуры тела). 2. Наличие гиперчувствительности к активному компоненту,

компоненту, вспомогательным веществам или веществам, используемым в производственном процессе, которые могут содержаться в следовых количествах (хлортетрациклин, гентамицин, неомицин, формальдегид).	вспомогательным веществам или веществам, используемым в производственном процессе, которые могут содержаться в следовых количествах (хлортетрациклин, гентамицин, неомицин, формальдегид). 3. Сильная реакция на предыдущую дозу вакцины (температура выше 40 °С, в месте введения вакцины - отек и гиперемия свыше 8 см в диаметре).
Если осложнение возникло после прививки, то оно должно рассматриваться, как противопоказание для дальнейшей вакцинации этой же вакциной до тех пор, пока не будет установлена причина осложнения. Это особенно важно в отношении побочных реакций, которые не ограничиваются местом инъекции.	Если осложнение возникло после прививки, то оно должно рассматриваться, как противопоказание для дальнейшей вакцинации этой же вакциной до тех пор, пока не будет установлена причина осложнения. Это особенно важно в отношении побочных реакций, которые не ограничиваются местом инъекции.

Фадеев Д.А.
Генеральный Директор
ООО «Новартис Фарма»