МИНЗДРАВ РОССИИ
П N015888/01-031218
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПРИОРИКС®/PRIORIX®

(Вакцина против кори, паротита и краснухи живая культуральная)

Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутримышечного введения

«ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.», Бельгия

ООО «СмитКляйн Бичем-Биомед», Россия

Изменение №7

Дата внесения Изменения «___» 031218 _____ 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ Приорикс® можно вводить одновременно (в один день) с АКДС и АДС вакцинами, живой и инактивированной полиомиелитной вакциной, вакциной против *H. ifluenzae* типа b, вакциной против гепатита В при условии инъекции препаратов отдельными шприцами в разные участки тела. Другие живые вирусные вакцины вводят с интервалом не менее 1 месяца. *Приорикс® не допускается смешивать с другими вакцинами в одном шприце.* Вакцина Приорикс® может быть использована для проведения повторной прививки лицам, ранее вакцинированным другой комбинированной вакциной против	**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ** Вакцину Приорикс® можно вводить одновременно (в один день) со следующими моновалентными и комбинированными вакцинами: вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В, полиомиелита (инактивированная) и инфекций, вызываемых *Haemophilus influenzae* тип b (АКаДС-ВГВ-ИПВ/Хиб), вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) (АКаДС), вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) с уменьшенным содержанием антигенов, вакцина для профилактики инфекции, вызываемой

Старая редакция	Новая редакция
кори, паротита и краснухи или соответствующими монопрепаратами. При необходимости постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена до или одновременно с вакцинацией, поскольку по имеющимся данным живые вакцины против кори (и возможно паротита) могут вызывать временное снижение чувствительности кожи к туберкулину. В связи с тем, что подобное снижение чувствительности может сохраняться от 4 до 6 недель, не следует осуществлять туберкулинодиагностику в течение указанного периода времени после вакцинации во избежание получения ложноотрицательных результатов. Пациентам, ранее получавшим препараты крови человека (иммуноглобулины, плазму и другие), вакцинацию следует отложить, по крайней мере, на три месяца из-за вероятности недостаточного формирования антител к вирусу паротита, кори и краснухи.	*Haemophilus influenzae* тип b (Хиб), вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная, вакцина для профилактики вирусного гепатита В, вакцина для профилактики вирусного гепатита А, вакцина менингококковая серогрупп А, С, W_{135}, Y конъюгированная, вакцина для профилактики ветряной оспы, вакцина для профилактики пневмококковых инфекций конъюгированная. Кроме того, в соответствии с общепринятой практикой допускается совместное введение комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита с пероральной полиомиелитной живой вакциной или с вакциной для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (цельноклеточной). При совместном введении вакцины Приорикс® с другими вакцинами инъекции различными вакцинами делают отдельными шприцами в разные участки тела. Если введение вакцины Приорикс® с другими живыми аттенуированными вакцинами невозможно выполнить одновременно, интервал между инъекциями различных вакцин должен составлять не менее 1 месяца. *Не допускается смешивать вакцину Приорикс® с другими вакцинами в одном шприце.* Вакцина Приорикс® может быть использована для проведения повторной прививки лицам, ранее вакцинированным другой комбинированной вакциной против кори, паротита и краснухи или соответствующими монопрепаратами. При необходимости постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена до или одновременно с

Старая редакция	Новая редакция
	вакцинацией, поскольку по имеющимся данным живые вакцины против кори (и возможно паротита) могут вызывать временное снижение чувствительности кожи к туберкулину. В связи с тем, что подобное снижение чувствительности может сохраняться от 4 до 6 недель, не следует проводить туберкулинодиагностику в течение указанного периода времени после вакцинации во избежание получения ложноотрицательных результатов. Лицам, получившим гамма-глобулин человека или перенесшим переливание крови, вакцинацию следует отложить не менее чем на 3 месяца по причине возможной неэффективности вакцинации вследствие пассивно приобретенных антител.

Менеджер отдела
регуляторных отношений
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

Артеменко И.Н.