Е-2005г

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА

ПЕРСЕН® (PERSEN®)

Торговое название:
ПЕРСЕН® /PERSEN®

Лекарственная форма:
Таблетки, покрытые оболочкой

Состав (на одну таблетку):
Активные вещества:

Экстракт валерианы сухой	50 мг
Экстракт мелиссы сухой	25 мг
Экстракт мяты перечной сухой	25 мг

Вспомогательные вещества:
целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кросповидон, лактоза, тальк, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, повидон, кальция карбонат, глицерин, сахароза, красители: краситель коричневый 75, титана диоксид, воск E Hoechst (Capol 600).

Описание:
Круглые, двояковыпуклые темно-коричневые таблетки, покрытые оболочкой.

Фармакологическая группа:
Седативное средство растительного происхождения
Код АТХ: N05CM

Фармакологические свойства:
Препарат обладает успокаивающим и спазмолитическим действием.
Экстракт корневищ с корнями валерианы оказывает успокаивающее действие.
Экстракт листьев мелиссы - успокаивающее и спазмолитическое,
Экстракт листьев мяты перечной - спазмолитическое, умеренное успокаивающее действие.

Показания к применению:
Повышенная нервная возбудимость, бессонница, раздражительность.

Противопоказания:
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет, артериальная гипотензия .

Копия верна
Королевцова
Менеджер
для документов

Лек фармацевтическая компания д.д. (Словения) Olek №2 * МОСКВА *

Способ применения и дозы:

Внутрь взрослым и подросткам старше 12 лет:
при повышенной нервной возбудимости, раздражительности – по 2 - 3 таблетки, покрытые оболочкой, 2 - 3 раза в день;
при бессоннице - по 2 - 3 таблетки, покрытые оболочкой, за 1 час перед сном.

Детям от 3-х до 12 лет: по назначению врача. Назначаемая доза зависит от массы тела (1 таблетка, покрытая оболочкой, 1 - 3 раза в день).
При прекращении лечения синдрома отмены не возникает.

Побочные действия:
Аллергические реакции, при длительном применении - запор.

Применение при беременности и кормлении грудью:
Применение препарата при беременности и кормлении грудью не изучено. Назначение препарата в период беременности (особенно в течение первого триместра) и грудного вскармливания возможно в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или младенца.

Передозировка:
Однократный прием 20 г корневищ с корнями валерианы (примерно 103 таблетки Персена) может вызвать ощущение усталости, спазмы в желудке, ощущение сжатия в груди, головокружение, дрожание рук, расширение зрачков, которые могут исчезнуть самостоятельно в течение 24 часов.
При явлениях передозировки целесообразно провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами:
Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, гипотензивных препаратов (в частности, центрального действия), обезболивающих средств, что требует коррекции доз.

Особые указания:
При применении в рекомендованных дозах Персен® не влияет на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.
Применение препарата у детей 3 – 12 лет только по назначению врача.
Не следует применять препарат непрерывно более 1,5 – 2 месяцев.

Форма выпуска:
Таблетки, покрытые оболочкой; по 10 таблеток в блистере; по 4 блистера в картонной пачке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения:
При температуре не выше 25°С, в недоступном для детей месте.

Срок годности:
3 года
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Лек
Фармацевтическая компания д.д. (Словения)
Sandoz
№2

Условия отпуска из аптек:
Без рецепта

Производитель:
Лек д.д.
Веровшкова 57, г.Любляна, Словения
Адрес представительства в России:
121002, г.Москва, Староконюшенный пер. д.10/10, стр.1

Директор ИДКЭЛС, профессор В.В. Чельцов

Представитель компании
«Лек д.д.» Е.Ю. Барманова