МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 003252 - 151015
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА

Регистрационный номер

Торговое название: Валерианы настойка

Группировочное наименование: Валерианы лекарственной корневища с корнями

Лекарственная форма: Настойка

Для получения препарата используют:

Валерианы корневища с корнями - 200 г

Этанол (спирт этиловый) 70% - достаточное количество до получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета характерного ароматного запаха.

В процессе хранения допускается образование налета на стенках флаконов.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство растительного происхождения.

Код АТХ N05CM09.

Фармакологические свойства

Настойка валерианы проявляет умеренно выраженный седативный эффект. Действующим началом препарата являются сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, свободная валериановая кислота. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабильно. Облегчает наступление сна. Кроме того, препарат оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру желудочно-кишечного тракта, обладает желчегонными свойствами, повышает секрецию желез желудочно-кишечного тракта.

Показания к применению

Повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комплексной терапии - функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы, спазмы желудочно - кишечного тракта.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

С осторожностью - хронический энтероколит, заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано.

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, до еды, разводя в небольшом количестве воды. Взрослым по 20-30 капель на прием 3-4 раза в день, детям – по 1 капле на каждый год жизни 1-3 раза в день. Курс лечения - до 4 недель. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

Побочное действие

Возможны вялость, слабость, сонливость, подавленность, снижение работоспособности (особенно при применении в высоких дозах), при длительном применении - запор. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка

При длительном применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Лечение – симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, а также спазмолитиков.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта: в максимальной разовой дозе препарата для взрослых содержится 0,32 г, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых содержится 1,3 г. В одной капле препарата содержится 0,01 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущими механизмами.

Форма выпуска

Настойка.

По 25, 50, 100 мл во флаконы-капельницы из стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

На каждый флакон-капельницу наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары или картона хром-эрзац макулатурного мелованного. Флаконы-капельницы с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона (для стационара или производственных отделов аптек).

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15° до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Организация, принимающая претензии

ЗАО «РФК»: Россия,

125438, г. Москва, ул. Войкова, дом 6, стр. 22.

Телефон/факс (495) 649-92-61.

Адрес производства

1. ЗАО «РФК», Россия,

303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя Любовша.

2. ЗАО «РФК», Россия,

303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Ключики.

Генеральный директор



В.В. Андерсон