**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ**

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-007964-170322
СОГЛАСОВАНО

**ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

**ЗУБНЫЕ КАПЛИ**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** ЗУБНЫЕ КАПЛИ

**Международное непатентованное или группировочное наименование**: Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Камфора + Мяты перечной листьев масло эфирное

**Лекарственная форма**: капли зубные

**Состав:**

**в 100 мл содержится:**

*Действующие вещества:*

| | |
|---|---|
| Мяты перечной листьев масло эфирное | 3,1 г |
| Камфора | 6,4 мг |
| Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка | До 100 мл |

**Описание:** Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**: Местнораздражающее средство.

**Код АТХ**: A01AD11.

**Фармакологические свойства**

Комбинированный препарат. Оказывает местнораздражающее (отвлекающее), умеренное обезболивающее, антисептическое, противовоспалительное и успокаивающее действие.

**Показания к применению**

Зубная боль (до оказания стоматологической врачебной помощи). В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет. Беременность, период грудного вскармливания.

**С осторожностью**

Детский возраст старше 12 лет.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

**Способ применения и дозы**

Местно. Ватный тампон, смоченный 2-3 каплями препарата, прикладывают к больному зубу на 5-10 минут.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При попадании на слизистую оболочку рта лекарственный препарат может вызвать ощущение жжения. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

При правильном применении лекарственного препарата (местно) передозировка маловероятна; при случайном приеме лекарственного препарата внутрь возможно появление симптомов раздражения желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота) и сонливости. Лечение: симптоматическое.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не описано.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период лечения лекарственным препаратом необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

**Форма выпуска**

Капли зубные.

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы или во флаконы-капельницы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками, с винтовыми крышками.

По 10, 15, 25, 50 мл во флаконы полимерные из полиэтилена высокой плотности, укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилена высокой или низкой плотности или из полиэтилентерефталата укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой

плотности, или во флаконы полимерные из полиэтилентерефталата, укупоренные крышкой из полиэтилена низкой плотности с уплотнительным элементом или пробкой из полиэтилена низкой плотности и винтовыми крышками из полиэтилена низкой плотности или пробкой-капельницей из полиэтилена низкой плотности и винтовой крышкой из полиэтилена низкой плотности.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги самоклеящейся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года. Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии:**

АО «Усолье-Сибирский Химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08

Генеральный директор
АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» Гостин С.В.