ЛП-№(010015)-(РГ-RU) от 30.04.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2025 № 11250
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ВАЛОКОРМИД

Регистрационный номер

Торговое наименование
Валокормид

Международное непатентованное или группировочное наименование
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Красавки листьев настойка+ Ландыша травы настойка+Натрия бромид+[Левоментол]

Лекарственная форма
Капли для приема внутрь

Состав:
Действующие вещества:

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	- 10 мл
Ландыша травы настойка	- 10 мл
Красавки листьев настойка	- 5 мл
Натрия бромид	- 4 г
Левоментол	- 0,25 г
Вспомогательное вещество:	
Вода очищенная	- до 30 мл

Описание
Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, с запахом валерианы и ментола.

Фармакотерапевтическая группа
Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства
Код АТХ N05CM

Фармакологическое действие
Комбинированный препарат, оказывает седативное, кардиотоническое и спазмолитическое действие. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка и натрия бромид уменьшают возбудимость центральной нервной системы. Ландыша травы настойка, содержащая сердечные гликозиды, оказывает кардиотоническое действие. Алкалоиды красавки обладают м-холиноблокирующим действием. Левоментол – местнораздражающее средство, оказывает венотонизирующее, анальгезирующее, рефлекторное коронародилатирующее и антиангинальное действие.

Показания к применению
В качестве успокаивающего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, выраженный кардиосклероз, эндокар-

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2025 № 11250
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

дит, миокардит; печеночная и/или почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, закрытоугольная глаукома.

С осторожностью
Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы
Внутрь по 10-20 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды 2-3 раза в день до еды.
Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие
Тошнота, рвота, диарея, изжога, аритмии, мышечная слабость, головная боль, парез аккомодации, возможны аллергические реакции.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
Симптомы: явления бромизма - ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, снижение памяти, кожная сыпь (acne bromica), апатия, сонливость, гастроэнтерит, нарушение координации движений.
Лечение: прекращение приема препарата, назначение больших количеств (при отсутствии противопоказаний) натрия хлорида – 10-20 г в сутки (ускоряет выведение брома), обильное питье (3-5 л в сутки), назначение диуретиков.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами
Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.
Алкоголь усиливает эффекты препарата Валокормид и может повышать его токсичность.
Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата «Валокормид» проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания
Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит 0,14 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата (60 капель) – 0,42 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами
В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 28.04.2025 № 11250
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Форма выпуска

Капли для приема внутрь. По 25 мл во флаконах/флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками и крышками навинчиваемыми из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы, с защитой или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия.

По 25 мл во флаконах полимерных из полиэтилена или полиэтилентерефталата в комплекте с укупорочными средствами из полипропилена или полиэтилена, или полиэтилентерефталата, или укупоренных пробками и крышками навинчиваемыми из полипропилена или полиэтилена, или пластмассы.

Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Флаконы/флаконы-капельницы без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку из картона гофрированного (для стационаров).

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Общество с ограниченной ответственностью «ДАНСОН-РУ»,
Россия, 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, помещение 1, комната 220.
Тел. +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Россия, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5;
Тел. +7 (4852) 44-38-56
e-mail: farmfab@yaroslavl.ru