ЛП-№(007982)-(РГ-RU) от 17.11.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.12.2024 № 26707
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГАСТРОСПАЗМИЛ

Регистрационный номер

Торговое наименование
Гастроспазмил

Международное непатентованное или группировочное наименование
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Красавки листьев настойка + Мяты перечной листьев настойка + Полыни горькой травы настойка

Лекарственная форма
Капли для приема внутрь

1 мл препарата содержит:
действующие вещества:

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	- 0,4 мл
Полыни горькой травы настойка	- 0,3 мл
Мяты перечной листьев настойка	- 0,2 мл
Красавки листьев настойка	- 0,1 мл

Описание
Прозрачная жидкость красновато-коричневого цвета с характерным запахом. Возможно наличие опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта; другие средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта.

Код АТХ A03AX

Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Комбинированный препарат растительного происхождения. Оказывает спазмолитическое, а также умеренное седативное действие.
Спазмолитический эффект капель обусловлен действием суммы алкалоидов красавки. Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка и мяты перечной листьев настойка оказывают седативное действие. Полыни горькой травы настойка нормализует функции желудка, рефлекторно вызывает усиление секреции желудочного сока, улучшая процесс пищеварения.
Фармакокинетика
Не применимо.

Показания к применению
Препарат применяют в качестве спазмолитического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры (хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка, хронический колит, хронический холецистит, дискинезия желчевыводящих путей).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.12.2024 № 26707
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Противопоказания
- гиперчувствительность к действующим веществам препарата;
- глаукома;
- гиперацидный гастрит;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения;
- беременность, период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет.

С осторожностью
Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Безопасность применения препарата Гастроспазмил при беременности не установлена, применение препарата во время беременности противопоказано.
Данные о проникновении компонентов препарата в грудное молоко отсутствуют, поэтому при необходимости приёма препарата в период грудного вскармливания следует решить вопрос о прекращении кормления грудью.

Способ применения и дозы
Внутрь. Препарат Гастроспазмил назначают взрослым по 20-30 капель на прием с небольшим количеством воды 3 раза в день за 30 минут до приема пищи.
Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно появление сухости кожи и слизистой оболочки полости рта, расширение зрачков, изжога, гастралгия, диарея, сонливость, снижение работоспособности.
Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка
При передозировке возможно усиление таких побочных эффектов, как сухость кожи и слизистой оболочки полости рта, расширение зрачков, изжога, гастралгия, диарея, сонливость, снижение работоспособности.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Препарат усиливает действие снотворных, седативных и спазмолитических лекарственных средств.
Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания
В составе препарата содержится не менее 60 % этилового спирта. В разовой дозе препарата (30 капель) содержится 0,34 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе (90 капель) содержится 1,01 г абсолютного этилового спирта.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.12.2024 № 26707
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска
Капли для приема внутрь. По 25 мл во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ, укупоренных пробками из полипропилена или полиэтилена низкой плотности или высокой плотности, или смеси полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, или пластмассы и крышками навинчиваемыми пластиковыми;
или по 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных пробками-капельницами из полипропилена или полиэтилена низкой плотности или высокой плотности, или пластмассы и крышками навинчиваемыми пластиковыми с защитой или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия;
или по 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФК, укупоренных пробками-капельницами из полипропилена или полиэтилена низкой плотности или высокой плотности, или смеси полиэтилена низкой плотности и полиэтилена высокой плотности, или пластмассы и крышками навинчиваемыми пластиковыми с защитой или без защиты от детей, с контролем первого вскрытия или без контроля первого вскрытия.
Каждый флакон/флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.
Упаковка для стационаров. От 9 до 300 флаконов/флаконов-капельниц без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в групповую упаковку из картона гофрированного, или картона для потребительской тары, или импортного.

Условия хранения
При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (флакон в пачке) или групповой упаковке (флаконы в картонной коробке) для защиты от света.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска
Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения
ООО «ДАНСОН-РУ»
Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, стр.49, пом.1, ком.220
Тел.: +7 (495) 580-30-60

Производитель/Организация принимающая претензии от потребителей
Акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»
Российская Федерация, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5
Тел.: +7 (4852) 44-38-56

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.12.2024 № 26707
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

e-mail: farm_info@yarff.ru

Директор АО «ЯФФ» Юдина Е.В.