

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Ландышево-валериановые капли

Регистрационный номер**Торговое наименование**

Ландышево-валериановые капли

Международное непатентованное или группировочное наименование

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка+Ландыша травы настойка

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав на 100 мл:

Ландыша травы настойка (ландыша настойка) - 50 мл

Валерианы лекарственной корневищ с корнями
настойка (валерианы настойка) - 50 мл

Описание

Прозрачная жидкость от красно-коричневого до зеленовато-коричневого цвета характерного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ N05CM**Фармакологические свойства**

Оказывает седативное, спазмолитическое, а также умеренное кардиотоническое действие.

Показания к применению

В комплексной терапии при повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна, спазмах желудочно-кишечного тракта, а также в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности I-II функционального класса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эндокардит, миокардит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, эпилепсия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Внутрь взрослым по 20 капель 2-3 раза в день.

Непрерывный курс лечения не должен превышать 1,5-2 месяца.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, мышечная слабость, головная боль, при длительном применении – запор.

Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему.

Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

В составе препарата содержится не менее 64 % спирта. В максимальной суточной дозе препарата (60 капель) содержится 0,65 г абсолютного этилового спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла, укупоренных пробками-капельницами или пробками и навинчиваемыми крышками.

На флаконы-капельницы наклеивают этикетки.

Каждый флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Упаковка для стационаров. По 18 кг «ангро» в канистрах из полиэтилена низкого давления с навинчивающимися крышками без предохранительного кольца или с предохранительным кольцом.

На канистры наклеивают этикетки.

Канистры для стационаров дополнительно снабжают инструкциями по медицинскому применению (наклеивают или вкладывают в специальный кармашек).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения, производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

Закрытое акционерное общество «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Россия, 150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, д. 5;
тел. (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «ЯФФ»



С.П. Атмашкин