МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000725-120319
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата
КАРНИЛАНД®

Регистрационный номер:
Торговое наименование Карниланд®
Международное непатентованное или группировочное наименование Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + Ландыша травы настойка + Левоментола раствор в ментил изовалерате + Нитроглицерин
Лекарственная форма капли подъязычные
Состав
Нитроглицерин раствор спиртовой 1 % - 2,17 мл
эквивалентно 17,8 мг нитроглицерина
Левоментола раствор в ментил изовалерате (валидол) - 4,35 мл
Ландыша травы настойка (ландыша настойка) - 21,7 мл
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка (валерианы настойка) - 21,7 мл
Вспомогательное вещество:
Этанол (этиловый спирт) 95 % - до 100 мл
Описание Прозрачная жидкость темного желто-зелёного цвета с запахом валерианы и ментола.
Фармакотерапевтическая группа Антиангинальное средство.
Код АТХ: [C01DA52]
Фармакологические свойства Седативное и спазмолитическое сосудорасширяющее, улучшающее кровоснабжение и метаболизм миокарда. Состав по действию аналогичен прописи, известной как капли Вотчала.
Показания к применению Купирование приступов стенокардии, кардиалгия.
Противопоказания Повышенная чувствительность к нитратам, шок, коллапс, одновременный прием ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью Внутричерепная гипертензия, состояния, сопровождающиеся снижением давления заполнения левого желудочка, в т.ч. тампонада сердца, изолированный митральный стеноз, констриктивный перикардит, неконтролируемая гиповолемия, сердечная недостаточность при нормальном или низком давлении в легочной артерии, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние, черепно-мозговая травма (недавно перенесенная), токсический отек легких, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, закрытоугольная форма глаукомы с высоким внутриглазным давлением; тяжелая анемия, гипертиреоз, нарушение мозгового кровообращения, шок, артериальная гипотензия (систолическое артериальное давление меньше 90 мм рт. ст.), алкоголизм.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания Применять препарат при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.
Способ применения и дозы Под язык. 10-15 капель принимают с небольшим количеством жидкости или наносят на кусок сахара и держат во рту (под языком), не проглатывая до полного всасывания. С учётом индивидуальной чувствительности и переносимости разовая доза может составлять от 5 до 25 капель. Увеличение разовой дозы с 15 до 25 капель

возможно по рекомендации врача. Частота и длительность применения капель зависят от частоты, интенсивности приступов стенокардии, эффективности и переносимости.

Побочное действие Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, "нитратная" головная боль, тахикардия, гиперемия, ощущение жара. Со стороны желудочно-кишечного тракта: сухость слизистой оболочки полости рта, тошнота. Неблагоприятные побочные реакции со стороны нервной системы: головокружение. При наличии побочных эффектов рекомендуется уменьшить дозу препарата для однократного приема.

Передозировка Симптомы: выраженное снижение артериального давления с ортостатической дисрегуляцией, рефлекторная тахикардия, головная боль; может развиться астения; головокружение, повышенная сонливость, чувство жара, тошнота, рвота. При подозрении на передозировку необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью. До прихода врача пострадавшего следует уложить, приподняв ноги.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Одновременное применение с вазодилататорами, гипотензивными средствами (ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, бета-адреноблокаторами, блокаторами "медленных" кальциевых каналов), прокаинамидом, трициклическими антидепрессантами, ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), ингибиторами фосфодиэстеразы-5 (силденафил, варденафил или тадалафил), а также этанолом, усиливает гипотензивный эффект. Одновременное применение с сапроптерином повышает риск развития артериальной гипотензии.

Особые указания На фоне применения препарата Карниланд® возможно значительное снижение артериального давления и появление головокружения при резком переходе в положение «стоя» из положения "лежа" или "сидя"; при употреблении алкоголя, при выполнении физических упражнений и при жаркой погоде. К препарату Карниланд®, как и ко всем органическим нитратам, при частом применении развивается привыкание, при этом требуется повышение дозы. В составе препарата содержится не менее 75% этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата содержится 1,96 г этанола.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска Капли подъязычные. 25 мл, 50 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла. 1 флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 ^{0}С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности. 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска Отпускают без рецепта.

Предприятие-производитель/
Организация, принимающая претензии
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»
Россия, 170024, г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 2
Тел./факс (4822) 44-41-19

Зам. ген. директора по качеству
ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика» Н.В. Лимонина