МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ИНСТРУКЦИЯ
# ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
# ВИСМУТА СУБНИТРАТ + ЙОД + ЦИНКА ОКСИД

**Регистрационный номер**

**Торговое наименование**

Висмута субнитрат + Йод + Цинка оксид

**Международное непатентованное наименование**

Висмута субнитрат + Йод + Цинка оксид

**Лекарственная форма**

Суппозитории ректальные

**Состав на один суппозиторий:**

*Действующие вещества:* висмута субнитрат (висмута нитрат основной) – 0,075 г, цинка оксид – 0,2 г, йод – 0,005 г.

*Вспомогательные вещества:* танин – 0,05 г, резорцинол – 0,005 г, метилтиониния хлорид – 0,003 г, жир твердый тип А – 2,001 г, эмульгатор Т-2 – 0,041 г.

**Описание**

Суппозитории серовато-зеленого или синевато-зеленого цвета, торпедообразной формы. Допускается появление на поверхности суппозитория белого налета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Геморроя средство лечения

**Код АТХ:** C05AX02.

**Фармакологические свойства**

Противогеморроидальное средство. Обладает антисептическим и вяжущим действием.

ЛП-005396-110319
СОГЛАСОВАНО

**Показания к применению**

Геморрой, трещины заднего прохода.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата возможно только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

В случае необходимости применения препарата во время беременности или в период грудного вскармливания следует предварительно проконсультироваться с врачом.

**Способ применения и дозы**

Ректально.

По 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки. Обычно длительность курса лечения составляет 7-10 дней.

Если через 7-10 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

Не описано.

При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Нет данных.

**Особые указания**

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. Не превышайте максимальные сроки лечения и

рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

**Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Нет данных.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из двухслойной пленки ПВХ/ПЭ или из пленки из полимерных материалов ПВХ/ПЭ или из пленки ПВХ/ПЭ белой комбинированной или из пленки поливинилхлоридной.

По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку картонную.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/Организация, принимающая претензии:**

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»

Россия, 300004, г. Тула, Торховский проезд, д. 10

Тел./факс: (4872)41-04-73

Директор

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» Л.Я. Рабинович