ЛП-№(009337)-(РГ-RU) от 29.12.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.03.2025 № 7064
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

НЕО-АНУЗОЛ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Нео-Анузол

Международное непатентованное или группировочное наименование: висмута субнитрат + йод + цинка оксид

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на один суппозиторий

Действующие вещества:

висмута субнитрат – 75 мг; йод – 5 мг; цинка окись (цинка оксид) – 200 мг.

Вспомогательные вещества:

танин – 50 мг; резорцинол (резорцин) – 5 мг; метилтиониния хлорид (метиленовый синий) – 3 мг; основа для суппозиториев: твердый жир, тип А – достаточное количество до получения суппозитория массой 2,38 г, эмульгатор Т-2 – до 2 % к массе основы.

Описание: суппозитории серовато-зеленого или синевато-зеленого цвета, торпедообразной формы. Допускается появление на поверхности суппозитория белого налета.

Фармакотерапевтическая группа: ангиопротекторы; средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения; другие средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТХ: C05AX02

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противогеморроидальное средство.

Обладает антисептическим и вяжущим действием.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Нео-Анузол показан к применению у взрослых в качестве лечения геморроя, трещин заднего прохода.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.03.2025 № 7064
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Противопоказания

Гиперчувствительность к висмута субнитрату, йоду, цинка окиси (цинка оксиду) или к любому из вспомогательных веществ.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение лекарственного препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Ректально.

По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки. Обычно длительность курса лечения составляет 7–10 дней.

Если через 7–10 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Классификация частоты возникновения побочных реакций: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, но < 1/10); нечасто (≥ 1/1000, но < 1/100); редко (≥ 1/10000, но < 1/1000); очень редко (< 1/10000), включая отдельные сообщения частота неизвестна – по имеющимся данным установить частоту возникновения не представлялось возможным.

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции по медицинскому применению побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции по медицинскому применению, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Не описано.

При передозировке препарата необходимо немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нет данных.

Особые указания

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны выше. Не превышайте максимальные сроки лечения и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 17.03.2025 № 7064
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0003)

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суппозитории ректальные.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной.

По две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителя

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.

Наименование производителя и адрес места производства лекарственного препарата

АО «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, стр. 3, стр. 8, т/ф (4212) 53-91-86, info@dhph.ru.