

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

АВИСАН

Регистрационный номер:**Торговое наименование:** Ависан**Международное непатентованное или группировочное наименование:** Виснаги морковевидной (амми зубной) плодов экстракт**Лекарственная форма:** таблетки, покрытые оболочкой**Состав****1 таблетка содержит:***Активного компонента*

Ависана экстракта сухого — 0,05 г
[Виснаги морковевидной (амми зубной) плодов
экстракт сухой] с содержанием суммы хромонов
в пересчете на келлин и сухое вещество 8,0 %

Вспомогательных веществ ядра

Сахарной пудры (сахароза) — 0,106 г
Магния карбоната основного (магния гидроксикарбонат) — 0,020 г
Крахмала картофельного — 0,020 г
Талька — 0,002 г
Кальция стеарата — 0,002 г

Вспомогательных веществ оболочки

Сахара (сахароза) — 0,122152 г
Талька — 0,002000 г
Магния карбоната основного (магния гидроксикарбонат) — 0,010477 г
Титана двуокиси пигментной (титана диоксид) — 0,006200 г
Поливинилпирролидона низкомолекулярного медицинского
(повидон) — 0,005965 г
Глицерина (глицерол) — 0,002982 г
Красителя тропеолин О — 0,000110 г
Воска пчелиного — 0,000057 г
Масла вазелинового (парафин жидкий) — 0,000057 г

Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в урологии; другие средства, применяемые в урологии.

Код АТХ: G04BX

Фармакологические свойства

Избирательно действует на гладкие мышцы мочеточников. Уменьшает или снимает боли у больных почечной коликой и облегчает продвижение конкрементов по мочевыводящим путям. Уменьшает дизурические явления.

Показания к применению

Спазм мочеточников, нефроуролитиаз, в том числе, почечная колика; цистит; при подготовке к катетеризации мочеточников.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в мочевых путях камней размером более 5 мм, наследственная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы-изомальтазы, детский возраст (до 18 лет).

Беременность и лактация

Не рекомендуется применять в период беременности и лактации в связи с отсутствием специальных исследований.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1-2 таблетки (50-100 мг) 3-4 раза в день после еды. Курс лечения – 1-3 недели.

Побочное действие

Аллергические реакции; у пациентов с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта возможны диспептические явления (тошнота, чувство дискомфорта и тяжести в эпигастральной области), проходящие при уменьшении дозы препарата.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Для облегчения отхождения камней рекомендуется принимать большое количество жидкости – 1,5-2 л внутрь за 2-3 часа до приема препарата.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке препарата содержится около 0,25 г углеводов (0,021 ХЕ).

Форма выпуска

Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 25 таблеток в банки оранжевого стекла с треугольным венчиком, укупоренные пластмассовыми натягиваемыми крышками с уплотнительными элементами. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической.

Каждую банку, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 15.09.2025 № 23132
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Держатель регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии
потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.