

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Радевит® Актив**

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Радевит® Актив

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Витамин Е + колекальциферол + ретинол

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав:

На 1 г мази:

Действующие вещества: ретинола пальмитат (витамин А) (в пересчете на 100 % ретинола пальмитат) - 10 мг (*состав на 1,0 г субстанции: витамин А пальмитат 982 мг (1,7 млн. МЕ), бутилгидроксианизол 9 мг, бутилгидрокситолуол 9 мг*), витамин Е (альфа-токоферола ацетат) - 5 мг, колекальциферол (витамин Д₃) (в пересчете на 100 % колекальциферол) - 0,05 мг (*состав на 1,0 г субстанции: витамин D₃ 25 мг (1,0 млн. МЕ), dl-альфа-токоферола ацетат 2,5 мг, триглицериды жирных кислот (со средней длиной цепи) 972,5 мг*).

Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол 1,0 мг, бутилгидроксианизол 1,0 мг, воск эмульсионный 80,0 мг, парафин жидкий (масло вазелиновое) 50,0 мг, глицерол (глицерин) 100,0 мг, этанол (спирт этиловый 95 %) 100,0 мг, вода очищенная до 1,0 г.

Описание. Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: дерматопротекторное средство.

Код АТХ (D10AD).

Фармакологические свойства

Обладает репаративным, противовоспалительным и противозудным действием, нормализует процессы ороговения, усиливает защитную функцию кожи.

Показания к применению

Комплексная терапия взрослых и детей, больных ихтиозом и ихтиозиформными дерматозами, себорейный дерматит, трещины, эрозии и ожоги кожи, неинфицированные раны и язвы, экзема, атопический дерматит, нейродермит, аллергический контактный дерматит (вне стадии обострения), псориаз, сухость кожи.

Профилактика рецидивов хронических воспалительных и аллергических заболеваний кожи, после прекращения лечения глюкокортикостероидами (в подострый период), при легко раздражимой коже, в том числе с повышенной чувствительностью к косметическим средствам.

Беременность и период лактации

Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беременности и в период лактации.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Гипервитаминозы А, Д, Е, прием ретиноидов.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 2 раза в день. При сильном шелушении кожи возможно использование окклюзионной повязки. Перед нанесением мази на трещины и другие дефекты кожи их предварительно обрабатывают антисептиками.

Длительность лечения зависит от локализации и тяжести процесса и может составлять несколько недель.

Побочное действие

При использовании в остром периоде – усиление зуда и эритемы (при этом препарат необходимо временно отменить до снижения остроты процесса). Аллергические реакции.

Передозировка

Во избежание передозировки и развития гипервитаминоза не рекомендуется наносить препарат на обширные поверхности кожи (свыше 80 %) более

6 недель.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не следует применять в сочетании с другими препаратами, содержащими ретиноиды, витамины А, Е и D (риск возникновения гипervитаминозов А, Е, D).

Действие мази ослабляется при одновременном назначении глюкокортикостероидов.

Назначение салицилатов и глюкокортикостероидов уменьшает побочные явления

Особые указания

Вспомогательные вещества

Бутилгидроксианизол (Е 320) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек,

Бутилгидрокситолуол (Е 321) может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит) или раздражение глаз и слизистых оболочек,

Данный лекарственный препарат содержит 100 мг спирта этилового (этанолa) в каждом 1 г мази. Может вызывать чувство жжения на поврежденной коже.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения. По 10, 15, 20 или 35 г в тубу алюминиевую с полимерным колпачком (бушоном).

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Замораживание не допускается.

Срок годности

4 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

ке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения /Производитель/

Организация, принимающая претензии:

АО «Ретиноиды», Россия

Юридический адрес:

143983, Московская обл., г. Балашиха, ул. Свободы (Керамик мкр.), д.1А,
офис 404

Адрес места производства и принятия претензий:

143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ул. Свободы, д.1А

Тел./факс: (495) 234-61-17

www.retinoids.ru