ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПАРКОН®

Регистрационный номер:
Торговое название: ПАРКОН®
МНН или группировочное название: водорода пероксид
Лекарственная форма: спрей назальный
Состав:
Раствор 1: раствор водорода пероксида 30 % - 0,33 г (0,1 г в пересчете на 100 % субстанции водорода пероксида), вода очищенная.
Раствор 2: бензойная кислота, маннитол, динатрия эдетат (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), вода очищенная.
Описание: оба раствора (1 и 2) – бесцветные, прозрачные жидкости, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа: противопаркинсоническое средство.
Код АТХ: [N04]

Фармакологическое действие

Противопаркинсоническое средство рефлекторного действия. Основное действующее вещество – низкодозированная перекись водорода. Действует преимущественно на рецепторы вомероназального органа, находящегося в носовой полости. Эти рецепторы имеют прямые анатомические и функциональные связи с промежуточным мозгом и базальными ганглиями, нейро-химические изменения в которых имеют прямое и косвенное воздействие на возникновение и развитие болезни Паркинсона, а также некоторых других поражений экстрапирамидной системы головного мозга.
Апплицируемая в области рецепторов носовой полости перекись водорода рефлекторным путем индуцирует эндогенные механизмы ингибирования МАО, преимущественно МАО-В базальных ганглиев. Кроме того, один из механизмов действия связан с активацией дофаминовых рецепторов (результат угнетения лактотропной функции аденогипофиза). Одновременно индуцируются эндогенные механизмы ингибирования МАО-А гипоталамуса, с чем могут быть связаны антидепрессивные эффекты препарата.
Под воздействием препарата уменьшается тремор, ригидность, пропульсия при ходьбе, сальность кожи и маскообразность лица, монотонность речи, увеличивается возможность бытового самообслуживания.
Перекись водорода в водимой концентрации системного действия не оказывает.
Фармакокинетика. В течение нескольких микросекунд после нанесения, перекись водорода разрушается каталазой, содержащейся в носовой слизи, с образованием воды и молекулярного кислорода.

Показания к применению

В составе комплексной терапии паркинсонизма различного генеза (преимущественно дрожательная форма).

Противопоказания

Гиперчувствительность, почечная недостаточность.
С осторожностью. Выраженная сердечная недостаточность, геморрагический инсульт, тромбофлебит.

Способ применения и дозы

Интраназально. Спрей впрыскивают по 2 раза в каждую ноздрю, с интервалом между впрысками в 10-15 сек 3 раза в день (утром, днем и вечером) независимо от приема пищи и состояния носоглотки (насморк не является противопоказанием для впрыскивания).


Курс лечения длится от 4-5 недель до 3-4 месяцев и более (при положительной динамике). Между курсами возможны перерывы в лечении до 2-3 недель.

Способ приготовления лекарственного раствора.

А) для пластикового флакона с крышкой-капельницей (Раствор 1) – см. рисунок, этапы 1-5: отвернуть защитный колпачок [1], отвернуть и снять крышку стеклянного флакона с Раствором 2 [2], ввести наконечник капельницы в стеклянный флакон, надавить на боковые стенки пластикового флакона и выдавить все содержимое в Раствор 2 [3]. На стеклянный флакон навинтить пробку-помпу, осторожно встряхнуть флакон для перемешивания жидкости, придерживая пальцами широкий ободок пробки-помпы снять защитный колпачок [4]. Направить флакон с Раствором 2 вертикально вверх и 3-5 раз резко нажать на ободок для пробного выпуска раствора в воздух (это необходимо для заполнения распылительной головки раствором) [5]. Препарат готов к применению.

Б) для полиэтиленового тюбика-капельницы (Раствор 1): довернуть до упора защитный колпачок для получения капельного отверстия. Ввести наконечник в предварительно открытый стеклянный флакон с Раствором 2. Остальные процедуры см. пункт А и рисунок.

В) для капельницы (Раствор 1): снять защитный колпачок с головки капельницы, отрезать ножницами верхушку капельницы и ввести наконечник в предварительно открытый стеклянный флакон с Раствором 2. Остальные процедуры см. пункт А и рисунок.



Побочное действие

Преходящая головная боль, ринит.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Совместим с большинством противопаркинсонических препаратов. Не рекомендуется сочетание с необратимыми ингибиторами МАО-В (селегинин и его производные). Снижает эффективность фенобарбитала.

Особые указания

Препарат в меньшей степени эффективен при акинетической и ригидной форме синдрома паркинсонизма. Длительное применение позволяет уменьшить дозу основного противопаркинсонического препарата, вплоть до его отмены.

Форма выпуска

Спрей назальный. 1 мл Раствора 1 в полиэтиленовом тюбике-капельнице или в пластиковом флаконе с крышкой-капельницей или в капельнице. 29 мл Раствора 2 во флаконе темного стекла. Тюбик-капельница (или пластиковый флакон с крышкой-капельницей или

капельница), стеклянный флакон, пробка-помпа в пакете из полиэтиленовой пленки, инструкция по применению упакованы в пачку из картона или хром-эрзаца.

Условия хранения невскрытой упаковки
Хранить в защищенном от света месте, при температуре 12-15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности
2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек
По рецепту.

Производитель:
ООО «РОЗФАРМ»
171260, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская, 1.
тел./факс: (48242) 58-189
по заказу
ООО «ПАРКИНФАРМ»
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, стр. 1,
тел./факс: (495) 589-12-25

И.о. директора ИДКЭЛС А.Н. Васильев

Генеральный директор
ООО «ПАРКИНФАРМ» А.С. Тертеров