

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Перекись водорода

Регистрационный номер

Торговое наименование. Перекись водорода

Международное непатентованное или группировочное наименование. Водорода пероксид

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения.

Состав

Действующее вещество: перекись водорода 3 %

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: антисептики и дезинфицирующие средства; другие антисептики и дезинфицирующие средства.

Код АТХ: D08AX01

Фармакологическое действие

Фармакодинамика

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (протеины, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения.

Для дезинфекции и дезодорирования: стоматит, тонзиллит, гинекологические заболевания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к водороду пероксида или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав лекарственного препарата.

С осторожностью

- Декомпенсированные заболевания печени и почек;
- гипертиреоз;
- герпетический дерматит.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

В период беременности применение препарата возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Лактация

В период кормления грудью применение препарата возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно в виде 3 % раствора. Местно (на слизистые оболочки) в виде 0,25 % раствора. Для получения 0,25 % раствора препарат разводят водой в соотношении 1:11. Неразбавленный раствор не применять для обработки слизистых оболочек!

Поврежденные участки кожи или слизистых оболочек обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата, или орошают струйно. Тампоны следует держать пинцетом!

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

Общие нарушения и реакции в месте введения: жжение в момент обработки раны.

Передозировка

Симптомы:

Раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларингоспазм). В случае попадания препарата внутрь возможно раздражение слизистой оболочки ЖКТ, гемоглобинурия, гемолиз. Летальная доза препарата составляет 3 г.

Лечение:

Промывание желудка 0,5 % раствором натрия тиосульфата, растворами натрия гидрокарбоната, внутривенное введение натрия тиосульфата 30 % в дозе до 300 мл.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Раствор перекиси водорода нестабилен в щелочной среде, в присутствии солей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Особые указания

Не рекомендуется использовать препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Обработка раны 3 % раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и другой раневой инфекцией.

Вспомогательные вещества

Препарат содержит натрия бензоат, который может раздражать кожу и слизистые оболочки.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения.

По 50 и 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные полимерными пробками, или полимерными пробками-капельницами из полиэтилена, или полимерными крышками из полиэтилена, или полимерными пробками, или полимерными пробками-капельницами из полиэтилена, или полимерными крышками навинчиваемыми из полиэтилена, или полимерными крышками винтовыми из полиэтилена, или полимерными пробками пластмассовыми с уплотнительными элементами, или

полимерными пробками пластмассовыми, или полимерными пробками-капельницами пластмассовыми, или полимерными крышками навинчиваемыми пластмассовыми, или полимерными крышками из полиэтилена, или полимерными крышками навинчиваемыми в составе с пробками-капельницами из полиэтилена, или полимерными пробками с уплотнительными элементами, или полимерными пробками-капельницами, или полимерными крышками навинчиваемыми, или полимерными крышками пластмассовыми или полимерными крышками пластмассовыми с капельницами, или полимерными крышками или полимерными крышками с капельницами, или полимерными капельницами и полимерными крышками винтовыми, или полимерными пробками укупорочными или полимерными пробками-капельницами, или полимерными крышками навинчиваемыми.

По 50 и 100 мл во флаконы полимерные из полиэтилена типа ФЛ в комплекте с полимерными пробками или пробками-капельницами из полиэтилена и полимерными крышками из полиэтилена, или во флаконы полимерные из ПЭТ, или ПЭВП, или ПЭНП в комплекте с полимерными крышками из полиэтилена, или во флаконы полимерные из ПЭТ, или ПЭВП, или ПЭНП, или во флаконы полимерные из ПЭТ, или ПЭВП, или ПЭНП в комплекте с полимерными крышками из полиэтилена, или в полимерными флаконы из ПЭТ в комплекте с полимерными колпачками из полиэтилена, или полимерными колпачками с капельницей из полипропилена.

На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или этикетки из бумаги самоклеящейся.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается нанесение текста инструкции по медицинскому применению на пачку.

Для стационаров. От 20 до 200 флаконов с равным количеством инструкций по медицинскому применению в ящик из гофрированного картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Наименование и адрес производственной площадки производителя

АО «Флора Кавказа», Россия

Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Подгорная, д. 62а/2, стр. 1 (производитель)

Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Подгорная, д. 62а/6, стр. 1; Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Подгорная, д. 62а/6, стр. 2; Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Подгорная, д. 62а/6, стр. 3 (фасовщик (первичная упаковка), упаковщик (вторичная (потребительская) упаковка))

Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, ст-ца Преградная, ул. Подгорная, д. 62а (выпускающий контроль качества)

Организация, принимающая претензии от потребителей

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 12.05.2026 № 9423
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

АО «Флора Кавказа», Россия

369260, Карачаево-Черкесская Республика, район Урупский, ст-ца Преградная,
ул. Подгорная, д. 62а.

Тел/факс (87876) 6-14-32, 6-16-77.