

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

Регистрационный номер

Торговое название

Перекись водорода

Группировочное название

Водорода пероксид&

Лекарственная форма

Раствор для местного и наружного применения

Состав на 100 мл:

Активное вещество: водорода перекись медицинская - от 10,0 г в пересчете фактического содержания водорода перекиси в исходном препарате на 30 % (эквивалентно содержанию водорода пероксида – 3,0 г)

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, вода очищенная

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Фармакокинетика

Не изучено

Код АТХ [D08AX01]

Фармакологическое действие

Антисептическое средство из группы оксидантов. При контакте перекиси водорода с поврежденной кожей или слизистыми оболочками высвобождается активный кислород, при этом происходит механическое очищение и инактивация органических веществ (белки, кровь, гной).

Антисептическое действие не является стерилизующим, при его применении происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов.

Обильное пенообразование способствует тромбообразованию и остановке кровотечений из мелких сосудов.

Показания к применению

В комплексной терапии при лечении гнойных ран, капиллярных кровотечений из поверхностных ран, носовых кровотечений.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Применение при беременности и лактации

Применение при беременности и лактации возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно в виде 3 % раствора. Местно (на слизистые оболочки) в виде 0,25 % раствора.

Для получения 0,25 % раствора препарат разводят водой в соотношении 1:11.

Неразбавленный раствор не применять для обработки слизистых оболочек носа.

Поврежденные участки кожи или слизистых оболочек носа обрабатывают ватным или марлевым тампоном, смоченным раствором препарата. Тампоны следует держать пинцетом! Возможно струйное орошение раневой поверхности.

Побочное действие

Жжение в момент обработки раневой поверхности, аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено

Взаимодействие с другими препаратами

Не изучено

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат под окклюзионные повязки.

Следует избегать попадания в глаза!

Не применять для орошения полостей!

Нестабилен в щелочной среде, в присутствии щелочей металлов, сложных радикалов некоторых оксидантов, а также на свету и в тепле.

Обработка раны раствором перекиси водорода не гарантирует от заражения столбняком и другой раневой инфекцией.

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения 3 %. По 40 мл во флаконы оранжевого стекла. Каждый флакон помещают в пачку картонную. Полный текст инструкции по медицинскому применению препарата наносят на пачку картонную. Флаконы без пачек с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящики из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Претензии потребителей направлять производителю:
ЗАО "Ярославская фармацевтическая фабрика"
150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, 5
тел/факс (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «Ярославская
фармацевтическая фабрика»



Л.В. Ефимова
Л.В. Ефимова

