ОДОБРЕНО

Фармакологическим

государственным комитетом

Минздрава России

"12" октября 1992 г.

ИНСТРУКЦИЯ

(информация для специалиста)

по медицинскому применению препарата

ТАБЛЕТКИ АМИНАЛОНА 0,25 г,

покрытые оболочкой

(Tabulettae Aminaloni 0,25 obductae)

Регистрационный номер

Аминалон - (γ-аминомасляная кислота) представляет собой белый кристаллический порошок со слабым специфическим запахом, гигроскопичен. Легко растворим в воде, очень мало растворим в 95% спирте, pH 5% водного раствора 6,5-7,5. Является биогенным веществом. Содержится в центральной нервной системе и принимает участие в обменных процессах головного мозга, применяется в медицинской практике в виде таблеток 0,25 г, покрытых оболочкой.

Фармакотерапевтическая группа

Ноотропное средство.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает ноотропное действие, усиливает энергетические процессы, повышает дыхательную активность тканей головного мозга, улучшает мышление, память, оказывает мягкое психостимулирующее действие. Препарат способствует восстановлению движений и речи после нарушения мозгового кровообращения. Ослабляет вестибулярные расстройства.

Показания к применению

Препарат назначают при сосудистых заболеваниях головного мозга (атеросклерозе, гипертонической болезни), при хронической церебрально-сосудистой недостаточности с нарушением памяти, внимания, речи, головокружениями и головной болью, при динамических нарушениях мозгового кровообращения, а также после инсульта и травм мозга с целью повышения

двигательной и психической активности больных. Назначают при алкогольных энцефалопатиях, алкогольных полиневритах, слабоумии. У детей с 1 года аминалон применяют при отсталости умственного развития с понижением психической активности.

Способ применения и дозы

Внутрь (до еды) по 0,25 г. Взрослым назначают в зависимости от характера и тяжести заболевания по 0,5-1,25 г 3 раза в день. Суточная доза - 1,5-3 г. Детям в зависимости от возраста назначают от 0,5 до 3 г в сутки. Курс лечения от 2-3 недель до 2-6 месяцев. При необходимости проводят повторные курсы лечения.

Для лечения симптомокомплекса укачивания аминалон назначают взрослым по 0,5 г и детям по 0,25 г 3 раза в день в течение 3-4 дней.

С профилактической целью взрослым назначают по 0,5 г 3 раза в день в течение 3 дней, предшествующих возможному укачиванию, и в той же дозе непосредственно перед пользованием транспортом.

Побочное действие

Возможны диспепсические явления (ощущение тяжести в желудке, тошнота, иногда рвота), нарушение сна, ощущение жара, колебания артериального давления (в первые дни лечения). В этих случаях следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Лекарственные взаимодействия

Препараты бензодиазепинового ряда потенцируют действие аминалона.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата.

Форма выпуска

Таблетки по 0,25 г, покрытые оболочкой, в банке по 100 штук.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте.

Условия отпуска из аптек

Отпускают по рецепту врача.

Срок годности

Изготовитель: Борисовский завод медицинских препаратов, Беларусь.