ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ГЕМАТОГЕН Л

Торговое название

Гематоген Л

Лекарственная форма

пастилки жевательные

Состав на 5 г препарата (1 пластинка)

активные вещества: альбумин черный пищевой (250 мг), железо (II) сернокислое 7-водное (15 мг), лизина гидрохлорид (50 мг); вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота (витамин С) (5 мг), молоко цельное сгущенное с сахаром (1990 мг), патока крахмальная (1050 мг), сахар-песок (сахароза) (2380 мг), ванилин (0,9 мг).

Описание

Пастилки коричневого или темно-коричневого цвета, специфического запаха, деленные 6 или 10 пластинок.

Фармакотерапевтическая группа

препарат железа+прочие препараты.

Код АТХ

в03ае.

Фармакологические свойства

Гематоген Л является источником полноценного белка, жиров, углеводов, минеральных веществ и аминокислот. Препарат повышает содержание гемоглобина в крови, восполняет дефицит железа, лизина (незаменимой аминокислоты) в организме.

Показания к медицинскому применению

Профилактика дефицита железа при несбалансированном питании у взрослых и детей в период интенсивного роста.

Режим дозирования, способ введения

Применяют внутрь, детям с 4 до 6 лет - по 1-2 пластинки в день, с 7 до 14 лет – по 1-3 пластинки в день, с 14 лет и взрослым – по 2-6 пластинок в день.

Возможные побочные реакции

Тошнота, чувство тяжести и боли в эпигастрии, потеря аппетита, диарея или запор. Аллергические реакции: сыпь, зуд.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушение углеводного обмена, анемии, не связанные с дефицитом железа, дефицит сахаразы/изомальтазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 4 лет.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, диарея. Лечение: промыть желудок 1% водным раствором натрия гидрокарбоната или назначить дефероксамин.

Взаимодействие с лекарственными средствами

При совместном применении тетрациклинов, D-пеницилламина, антацидов, содержащих соли алюминия, магния и кальция, снижается всасывание препаратов железа.

Беременность и лактация

Перед применением проконсультироваться с врачом.

Меры предосторожности

Не рекомендуется сочетать с другими препаратами железа.

Особые указания

Одна пластинка содержит 0,4 ХЕ.

Сведения о возможном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами

Не влияет.

Срок годности

12 месяцев. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Форма выпуска

Пастилка 50 г (10 пластинок) в обертке из пленочного материала с нанесенной инструкцией по медицинскому применению.

Пастилка 30 г (6 пластинок) в обертке из пленочного материала с нанесенной инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15 до 21° С.

Производитель (организация, уполномоченная принимать претензии)

ООО «Возрождение и Развитие»

Россия, 394000, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 51-А

Т/ф (473) 253-16-89, vozrrazv@vmail.ru

Условия отпуска

Без рецепта.

Директор ООО "Возрождение и Развитие" Н.Н. Смешков