МИНЗДРАВ РОССИИ
Р N003265/01-161220
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Феррогематоген®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Феррогематоген®

Международное непатентованное или группировочное наименование: гематоген

Лекарственная форма: пастилки жевательные

Состав на одну пастилку массой 50 г
Действующие вещества:
Альбумин черный пищевой - 2,375 г
Аскорбиновая кислота (витамин С) - 50 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) - 2 мг
Фолиевая кислота - 100 мкг
Железа сульфата гептагидрат - 24,89 мг
в пересчете на железо – 5 мг
Меди сульфата пентагидрат – 0,98 мг
в пересчете на медь - 250 мкг
Вспомогательные вещества:
Молоко цельное сгущенное с сахаром - 16,88954 г, патока крахмальная карамельная - 10,66336 г, сахароза (сахар белый кристаллический ТС2) - 19,48213 г, ванилин - 12,00 мг, глицерол (глицерин) - 500,00 мг.

Описание: пастилки коричневого или темно-коричневого цвета, поделенные на 6 прямоугольных долек, с характерным запахом

Фармакотерапевтическая группа: препараты железа в комбинации с другими препаратами

Код АТХ: B03AE10

Фармакологические свойства

Феррогематоген® является источником полноценного белка, жиров и углеводов. Минеральные вещества и все аминокислоты содержатся в оптимальном для организма соотношении. Препарат повышает содержание гемоглобина в крови, улучшает морфологические характеристики эритроцитов.

Входящие в состав препарата Феррогематоген® сульфат меди, аскорбиновая и фолиевая кислоты, а также пиридоксина гидрохлорид способствуют более активному всасыванию

железа и его поступлению в системный кровоток, приводя к восстановлению его нормального содержания в организме. Наличие в составе препарата пищевого альбумина, сгущенного молока и сахара позволяет использовать его в качестве пищевой добавки при недостаточном питании.

Показания к применению

Применяется в качестве лечебно-профилактического средства при неполноценном питании.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; анемии, не связанные с дефицитом железа, перегрузка железом (гемохроматоз), нарушение утилизации железа, нарушение углеводного обмена; дефицит сахаразы/ изомальтазы; непереносимость фруктозы; глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 3-х лет.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

С осторожностью

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Если у Вас есть одно из перечисленных выше заболеваний/состояний или факторов риска перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности и грудного вскармливания

Во избежание риска передозировки железа и витаминов, перед применением препарата Феррогематоген®, если Вы беременны или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослым по 1-2 дольки 2-3 раза в день, детям от 3 лет по 1 дольке 2-3 раза в день.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Для определения частоты возникновения побочных эффектов препарата применяют следующую классификацию: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 и < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 и < 1/100); редко (≥ 1/10000 и < 1/1000); очень редко (< 1/10000); частота неизвестна (не может быть установлена на основании имеющихся данных).

Со стороны иммунной системы:

частота неизвестна: аллергические реакции.

Со стороны желудочно-кишечного тракта:

частота неизвестна: тошнота, диарея.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Не отмечена.

При появлении симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Снижает абсорбцию тетрациклинов, пеницилламина.

Не рекомендуется одновременное применение антацидов.

Если Вы применяете выше перечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Феррогематоген® проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Внимательно прочитайте инструкцию по применению перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию.

- *Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*

Одна пастилка (50 г) содержит 3,6 ХЕ. В одной дольке препарата содержится 0,6 ХЕ.

Не рекомендуется сочетать с другими препаратами железа, витаминно-минеральными комплексами, содержащими компоненты, входящие в состав препарата Феррогематоген®.

Содержит сахар.

Не превышать максимальные сроки и рекомендованные дозы при самостоятельном применении препарата. В случае отсутствия уменьшения или при утяжелении симптомов заболевания необходимо обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Пастилки жевательные.

По одной пастилке в упаковку гибкую из многослойных полимерных и комбинированных материалов. Этикетка печатается на гибкой упаковке.

Пастилки помещают в групповую упаковку или непосредственно в транспортную тару с соответствующим количеством инструкций по применению.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

1 год.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/ организация, принимающая претензии:

Открытое акционерное общество «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод» (ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»), Россия

450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, д. 28, тел./факс (347) 272 92 85, www.pharmstd.ru.

Производитель:

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru.

Представитель
ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" Е.В. Толстова

