

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ГИДРОКОРТИЗОН-ПОС

Регистрационный номер:

Торговое название препарата ГИДРОКОРТИЗОН-ПОС

Международное непатентованное наименование: Гидрокортизон

Химическое название 11 β ,17,21-тригидроксипрегн-4-ен-3,20-дион-21-ацетат

Лекарственная форма: мазь глазная

Состав:

1 г мази глазной Гидрокортизон-ПОС 1 % содержит:

Активное вещество: гидрокортизона ацетат 10.0 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

1 г мази глазной Гидрокортизон-ПОС 2.5 % содержит:

Активное вещество: гидрокортизона ацетат 25.0 мг

Вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, ланолин.

Описание

Белая с желтоватым оттенком гомогенная суспензионная мазь.

Фармакотерапевтическая группа - глюкокортикостероид для местного применения.

Код АТХ S01BA02


Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат содержит в качестве активного вещества гидрокортизона ацетат - глюкокортикостероид.

При местном применении гидрокортизона ацетат подавляет воспалительные и аллергические реакции, возникающие в области наружных оболочек и переднего отрезка глаза.

Действие гидрокортизона ацетата, как и других кортикостероидов основывается на подавлении функции лейкоцитов и тканевых макрофагов. Ограничивает миграцию лейкоцитов, макрофагов и тучных клеток в область воспаления и подавляет образование интерлейкина-1. Способствует стабилизации лизосомальных мембран, снижая тем самым концентрацию протеолитических ферментов в области воспаления. Уменьшает проницаемость капилляров, обусловленную высвобождением гистамина. Подавляет активность фибробластов и образование коллагена. Ингибирует активность фосфолипазы А₂, что приводит к подавлению синтеза простагландинов и лейкотриенов.



Фармакокинетика

Возможно проникновение гидрокортизона ацетата через роговицу во влагу передней камеры глаза за счет липофильных свойств. Проникновение гидрокортизона ацетата в ткани зависит от состояния роговицы и значительно увеличивается в случае воспаления или повреждения слизистой глаза.

Показания к применению

- Аллергический конъюнктивит, блефарит, блефароконъюнктивит;
- Острый и хронический ирит, иридоциклит;
- Воспалительные явления после хирургического вмешательства на глазном яблоке;
- Подавление неоваскуляризации после перенесенных кератитов, химических ожогов.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата;
- Поверхностный герпес роговицы и другие вирусные заболевания глаз;
- Нарушения целостности эпителия и повреждения роговицы;
- Туберкулезная, бактериальная или грибковая инфекции глаз;
- Трахома;
- Период вакцинации.

Беременность и лактация

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата Гидрокортизон-ПОС 1 %, 2.5 % мазь глазная во время беременности, лактации, а также у детей отсутствуют. Возможно применение препарата Гидрокортизон-ПОС 1 %, 2.5 % мазь глазная для лечения детей старше 1 года, беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если ожидаемый лечебный эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов. Длительность применения препарата у данной категории пациентов не более 7-10 дней.

Способ применения и дозы

При отсутствии других рекомендаций Вашего врача, точно следуйте данной инструкции по применению препарата Гидрокортизон-ПОС глазная мазь 1 %, 2.5 %.

Полоска мази длиной 1 см закладывается 2-3 раза в день за нижнее веко.

Для этого откройте тюбик, слегка наклоните голову назад и заложите полоску мази длиной 1 см за нижнее веко. Осторожно закройте глаза.

После использования плотно закройте тюбик.

Во время аппликации глазной мази следует избегать контакта тюбика с поверхностью кожи или конъюнктивы.

При одновременном применении нескольких глазных лекарственных средств рекомендуется закладывать Гидрокортизон-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % не ранее чем через 15 минут после использования глазных капель.

Длительность лечения препаратом Гидрокортизон-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % обычно не превышает 2-х, максимум 3-х недель.

Побочное действие

Если при лечении препаратом Гидрокортизон-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % у Вас развился побочный эффект, не указанный в этой инструкции, или Вы не уверены в эффективности препарата, пожалуйста, проинформируйте Вашего доктора или фармацевта.

В очень редких случаях возможны аллергические реакции, такие как жжение, инъекционность склер, контактный дерматит, дерматоconjunctivitis, экзема век.

Длительное применение препарата может стать причиной возникновения вторичной глаукомы и осложненной катаракты; поэтому при применении препарата более 2-х недель, а также



Handwritten signature

Handwritten initials

у пациентов, имеющих в анамнезе глаукому, рекомендуется регулярно контролировать внутриглазное давление.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить использование препарата и как можно скорее обратиться к лечащему доктору (офтальмологу).

Передозировка

При местном применении в рекомендуемой дозе симптомы передозировки не отмечались.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Одновременное применение Гидрокортизона-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % и других средств, которые могут вызывать повышение внутриглазного давления (например, атропина и других холинергических препаратов) может способствовать дополнительному повышению внутриглазного давления, особенно у предрасположенных к этому больных.

Особые указания

Во время лечения препаратом Гидрокортизон-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % не рекомендуется пользоваться контактными линзами.

Сразу после применения препарата Гидрокортизон-ПОС мазь глазная 1 %, 2.5 % может возникнуть кратковременное нарушение остроты зрения, приводящее к замедлению психических и физических реакций. Поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта.

Форма выпуска

Мазь глазная 1 %, 2.5 %.

По 2.5 г в тубы алюминиевые, с полиэтиленовым наконечником и навинчивающейся крышкой. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Список Б. Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в местах, недоступных для детей!

Срок годности

В закрытой оригинальной упаковке: 3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ

Индустриштрассе, Д-66129 Саарбрюкен, Германия.

Претензии по качеству препарата направлять по адресу:

Представительство в Москве:

127473, г. Москва, ул. Краснопресненская, д. 16, стр. 1

Тел/факс: (495) 739-07-51

e-mail: ursapharm@ursapharm.ru

И.о. директора ИДКЭЛС

Васильев А.Н.

Представитель фирмы

Чернышева Т.В.

