

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ТАРЖИФОРТ®**

(торговое наименование лекарственного препарата)

суппозитории вагинальные

(лекарственная форма)

ООО «ФАРМАПРИМ», Республика Молдова

(наименование производителя готовой лекарственной формы и первичной упаковки, страна)

ООО «Авексима Сибирь», Россия

(наименование производителя вторичной (потребительской) упаковки и выпускающий контроль качества, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Дата внесения Изменения « _____ » _____ 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
Способ применения и дозы Интравагинально, 1 суппозиторий перед сном в течение 10 дней. Суппозиторий (предварительно освободив от контурной упаковки) следует вводить глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, после гигиенической обработки наружных половых органов. Повторные курсы лечения возможны после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по медицинскому применению.	Способ применения и дозы Интравагинально. 1 суппозиторий (предварительно освободив от контурной упаковки) вводят глубоко во влагалище, в положении лежа на спине, после гигиенической обработки наружных половых органов, перед сном. Продолжительность курса терапии – 10 дней. Повторные курсы лечения возможны после консультации с врачом. Для профилактики урогенитальных инфекций препарат назначают в течение 5 дней до и 5 дней после полостных гинекологических операций. Для профилактики урогенитальных инфекций перед диагностическими процедурами, малыми гинекологическими операциями, до и после установки внутриматочных контрацептивов препарат назначают в течение 1 – 5 дней. Если после лечения улучшения не наступает

Старая редакция	Новая редакция
	или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по медицинскому применению.

Начальник регуляторного департамента

ОАО «Авексима»



Н.Ю. Степушина