

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Ксимедон®

Регистрационный номер

Торговое наименование

Ксимедон®

Международное непатентованное или группировочное наименование

Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

1 таблетка содержит:

Действующее вещество: гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин – 250 мг.

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кальция стеарат.

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от белого до светло-розового цвета или светло-розового с желтоватым оттенком цвета с вкраплениями более интенсивного оттенка, с фаской и риской с одной стороны.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лечебные средства.

Код АТХ: VO3AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Гидроксиэтилдиметилдигидропиримидин ускоряет процессы регенерации тканей и сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, улучшает приживление кожных трансплантатов при аутодермопластике. Способствует нормализации соотношения между содержанием фибриногена в крови и ее фибринолитической активностью, улучшает регионарное кровообращение. Нормализует иммунную систему, повышает фагоцитарную активность Т-лимфоцитов и неспецифическую резистентность организма. Стимулирует эритро- и лейкопоз, клеточные и гуморальные факторы защиты, оказывает противовоспалительное и антимикробное действие.

Фармакокинетика

При пероральном приеме гидроксиэтилдиметилдигидропиримидина происходит быстрое всасывание его в течение 0,5–1 ч; максимальная концентрация препарата в сыворотке крови достигается через 1,7 ч. Период полувыведения препарата составляет 5,5 ч. В результате низкого процента связывания с сывороточным альбумином (9 %) и отсутствием биотрансформации в организме препарат не оказывает конкурентного действия при приеме других лекарственных средств.

Показания к применению

В комплексной терапии следующих заболеваний:

- глубокие и поверхностные ожоги (подготовка больных к аутодермопластике);
- длительно незаживающие раны;
- трофические язвы;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- пролежни;
- отморожения;
- гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и костей;
- хронический остеомиелит;
- стрептококковые инфекции (ангина, рожа);
- микробная экзема;
- псориаз;
- вирусные гепатиты;
- туберкулез легких;
- пневмония;
- хронический бронхит;
- хронический кистозный синусит;
- сальмонеллез;
- ревматизм;
- тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей;
- до- и послеоперационные периоды для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к гидроксиэтилдиметилдигидропиримидину и другим компонентам препарата;

- лейкоз (острый и хронический);
- эритремия;
- детский возраст до 18 лет.

С осторожностью

Пациентам с сахарным диабетом следует чаще определять толерантность к глюкозе, ввиду возможного уменьшения потребности в инсулине.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата показано только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период лечения необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Применять внутрь до еды.

При глубоких и поверхностных ожогах (подготовке больных к аутодермопластике) – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 20 дней. При проведении кожно-пластических операций препарат назначают до и после операции по 10 дней.

При длительно незаживающих ранах, трофических язвах, пролежнях – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 25–30 дней.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки – по 500 мг (2 таблетки) 2 раза в день курсом 12 дней.

При отморожениях – по 250–500 мг (1–2 таблетки) 3–4 раза в день в течение 2–5 недель.

При гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тканей и костей – по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10–30 дней.

При хроническом остеомиелите – до и после операции по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 20–25 суток. Повторные курсы лечения проводят через 6 месяцев на протяжении 1,5 лет.

При ангине, роже – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7–10 дней.

При микробной экземе – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней.

При псориазе – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2–3 недель.

При вирусных гепатитах В и С – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 10 дней.

При туберкулезе легких – по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 2 месяцев.

При пневмонии и хроническом бронхите – по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 18–21 дня.

При хроническом кистозном синусите – по 250–500 мг (1–2 таблетки) 4 раза в день в течение 1 месяца.

При сальмонеллезе – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 7 дней.

При ревматизме – по 500 мг (2 таблетки) 3 раза в день в течение 3–4 недель.

В до- и послеоперационном периодах для профилактики гнойно-воспалительных осложнений послеоперационных ран, особенно у больных с высоким риском несостоятельности швов брюшной стенки (анемия, сахарный диабет и др.) и желудочно-кишечного тракта – по 500 мг (2 таблетки) 4 раза в день в течение 10–20 дней (с первого дня после операции или в дооперационный период 3–5 дней и далее с первого дня после операции).

Побочное действие

Возможны – диспепсия, аллергические реакции.

Передозировка

В связи с малой токсичностью и большой широтой терапевтического действия гидроксипиримидина случаев токсических проявлений не наблюдалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместимость Ксимедона® с какими-либо лекарственными препаратами не выявлена.

Можно комбинировать с анаболическими стероидами, химическими и биологическими антисептиками.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

2, 5, 6 или 10 контурные ячейковые упаковки по 10 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7(843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru

**Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии
от потребителей**

АО "Татхимфармпрепараты", Россия

420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260

тел.: 8 800 201 98 88, тел./факс: +7(843) 571-85-58

e-mail: marketing@tatpharm.ru