МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 130-АЛИУМ

раствор для инфузий, 6 %

ООО «ПФК «Алиум», Россия

Изменение № 2

Дата внесения изменения «__»240920 20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Раствор для инфузий, 6 %. По 250 мл, 500 мл в пластиковые флаконы с запаянной горловиной из полиэтилена низкой плотности без колпачка или с пластиковым колпачком, со шкалой объемов на боковой поверхности или без нее, с кольцом держателем на дне флакона или без него. По 1 флакону помещают в индивидуальную картонную пачку вместе с инструкцией по применению. или От 1 до 40 флаконов помещают в ящики из гофрированного картона с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).	Раствор для инфузий, 6 %. По 250 мл, 500 мл в пластиковые флаконы с запаянной горловиной из полиэтилена низкой плотности без колпачка или с пластиковым колпачком, со шкалой объемов на боковой поверхности или без нее, с кольцом держателем на дне флакона или без него. По 1 флакону помещают в индивидуальную картонную пачку вместе с инструкцией по применению. или По 1, 10, 15 или 20 флаконов помещают в ящики из гофрированного картона с равным количеством инструкций по применению (для стационаров).

Директор по регуляторике и исследованиям **Сетдекова Г.У.**